

**Tab. A - 1:** Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Tier- und Pflanzenschutz

| ID                  | Lage                                  | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                         |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------|
| <a href="#">001</a> | Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf     | Grünlandgebiet, überwiegend intensiv genutzt   | Wachtelkönig, Weißstorch   | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">002</a> | Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf     | Grünlandgebiet, überwiegend intensiv genutzt   | Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Weißstorch  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Pufferbereich zu Wiesenvogelbrutgebiet / Nahrungshabitat Weißstorch                             | 1    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">003</a> | Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf     | Großflächiges Grünlandgebiet, überwiegend extensiv genutzt / Feuchtgrünland / Gehölzbestände / Sümpfe / kleinräumige Parzellierung   | Wachtelkönig, Bekassine, Braunkelchen, Feldlerche, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rebhuhn, Uferschnepfe, Weißstorch | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum des Weißstorches und Amphibienarten / Nahrungsbiotop für Greifvögel     | 1    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">004</a> | Elbmarsch, nördlich Neu Wulmstorf     | Nincoper-Neuenfelder Moor und angrenzende Flächen (entwässertes Hochmoor / Moorheide / verlandende Torfstiche / Pfeifegras-Degenerationsstadien, Birkenbruchwald / feuchtes und mesophiles Grünland / Feuchtgebüsch / Entwässerungsgräben / im Randbereich Acker / Ruderalflächen / intensiv genutztes Grünland) | Wachtelkönig, Neuntöter, Weißstorch  | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">005</a> | Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf | Regenrückhaltebecken   |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Rastgebiet für Wasservögel  | 2    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">006</a> | Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf | Feuchtgrünland / mesophiles Grünland, Feuchtgebüsch / kleine Feuchtwälder / Niedermoor   | Wachtelkönig, Weißstorch   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | NLWKN, LRP 94, Kartierung A 26 |
| <a href="#">007</a> | Elbmarsch, nordwestlich Neu Wulmstorf | Mesophiles Grünland / Ruderalflächen und Gebüsche  | Weißstorch   | Pufferzone zwischen Schutzgebiet und Siedlungs- und Gewerbegebiet / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">008</a> | Neu Wulmstorf, südlich der B 73       | Bachtal / Feuchtgrünland / Brachestadien / mesophiles Grünland / Gehölzbestände  |  | Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / teilweise naturnahe Vegetationsbestände   | 2    | LRP 94                         |
| <a href="#">009</a> | südlich Neu Wulmstorf                 | Bachtal / Feuchtgrünland / Sumpflvegetation / mesophiles Grünland / Feuchtgebüsch  |  | Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / naturnahe Vegetationsbestände   | 2    | LRP 94                         |

| ID                  | Lage                         | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|------------------------------|---|--|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">010</a> | Südwestlich<br>Neu Wulmstorf | Kleinräumig verschiedene Habitate / Reliefliefung mit Steilböschungen in ehemaligem Sandabgrabungsgebiet aus Birken-, z.T. Kiefernauwuchs / offene Sandflächen / Sandheide / Sandmagerrasen / Landröhricht / kleinere Tümpel / Ruderalflächen / Eichenmischwald | Orthetrum cancellatum, Coenagrion puella, Sympetrum vulgatum, Libellula depressa | Lebensraum für Amphibien- und Reptilienarten (Laichhabitate) / gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum wärmeliebender Insektenarten | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">011</a> | Südlich<br>Neu Wulmstorf     | Moränen-Unterhang / Sumpfvvegetation / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch / kleine Hangquellmoore / Moorheide / verlandende Torfstiche  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum von Amphibienarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">012</a> | Südöstlich<br>Neu Wulmstorf  | Feuchtgebüsch und Sumpfvvegetation  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum von Amphibienarten   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">013</a> | Südöstlich<br>Neu Wulmstorf  | Truppenübungsplatz / Heidevegetation / offene Sandflächen / Kiefern- und Birkenbestände   |  | Vorkommen gefährdete Vegetationsbestände / Lebensraum trockenheitsliebender Tierarten  | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">014</a> | Nordwestlich<br>Ardestorf    | Abbaugelbiet mit größeren Offenbodenbereichen / Ruderalfläche   |  | Potentieller Lebensraum für Amphibien- und Reptilienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Feucht- und Trockengelbiete   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">015</a> | Nordwestlich<br>Elstorf      | 2 im Grünland gelegene Tümpel   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">016</a> | Nordwestlich<br>Elstorf      | Mesophiles Grünland / geringer Gehölzbestand  |  | Lebens- und Wanderraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">017</a> | Nordwestlich<br>Elstorf      | Fliegenmoor / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / stark eutrophe Tümpel / Entwässerungsgräben  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop von Röhrichtbrütern  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">018</a> | Westlich<br>Daerstorf        | Ehemalige Sandabgrabung / Trockenbrache / Sandmagerrasen / offene Sandflächen / z.T. steile Böschungen  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum wärmeliebender Insektenarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">019</a> | Westlich<br>Daerstorf        | Eutropher Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / im Süden angrenzend Sandmagerrasen   |  | Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">020</a> | Nördlich<br>Hasenbuschfeld   | Feucht- und Nassgrünland / Tümpel   |  | Lebensraum und Vermehrungsgebiet z.T. gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">021</a> | Nördlich<br>Elstorf          | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">022</a> | Nördlich<br>Elstorf          | Feuchtgrünland / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">023</a> | Östlich<br>Daerstorf         | Sumpf- und Moorvegetation / Pionierwald / Teich   |  | Potentieller Lebensraum und Standort zahlreicher Tier- und Pflanzenarten   | 2    | Biotopkartierung 2009         |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung   | Arten                                   | Bedeutung   | Wert | Quelle          |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|------|-----------------|
| <a href="#">024</a> | Nordöstlich Moissburg             | Bachtal / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / mesophiles Grünland / Kleinwälder / eutropher Teich / begradigter Bach                       |   | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien / naturnahe Vegetationsbestände  | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">025</a> | Nördlich Siedlung Grauen          | Mesotropher Teich inmitten von Ackerflächen / Schwimmblattzone / Seggenzone  |   | Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten         | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">026</a> | Nördlich Siedlung Grauen          | Mesotropher Teich in einer Brachfläche / Schwimmblattvegetation / Seggenzone   |   | Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">027</a> | Östlich Siedlung Grauen           | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">028</a> | Südöstlich Siedlung Grauen        | Eutropher Teich im Ackerland / Schwimmblattvegetation  |   | Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">029</a> | Eversen Heide und Siedlung Grauen | Gebiet mit zahlreichen Kleingewässern, die in der Regel weniger als 1 km voneinander entfernt liegen / zahlreiche kleine Abbaugewässer |   | Lebensraum, Wanderraum und Vermehrungsgebiet zahlreicher, z.T. gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten  | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">030</a> | Westlich Elstorf                  | Eutropher Teich in einer Brachfläche / randliche Gehölze   |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">031</a> | Nördlich Grauen                   | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation   |   | Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">032</a> | Nördlich Grauen                   | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation   |   | Gefährdete Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">033</a> | Nördlich Eversen, Heide           | 2 eutrophe Tümpel im Grünland / randliche Gehölze  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">034</a> | Südlich Schwiederstorf            | Seggenried / Feuchtbrache / mesophiles Grünland / Graben / randliche Wallhecke   |   | Gefährdeter Vegetationsbestand / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Vermehrungsgebiet von Amphibienarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">035</a> | Südlich Elstorf                   | Eutropher Teich in Ackerfläche / Seggenzone  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">036</a> | Nordöstlich Eversen Heide         | Mesotropher Teich in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Seggenried / randlich Brachfläche und Gehölzbestände                       |   | Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten                 | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">037</a> | Östlich Schwiederstorf            | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / keine Strauchschicht / Einzäunung und Naturverjüngung  |   | Möglichkeit zur Entwicklung eines naturnahen Waldbestandes  | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">038</a> | Westlich Rahmstorf                | Kiesabbaugewässer / offene Sandfläche / umgeben von Kiefern- und Eichenmischwald   | Flussregenpfeifer, Uferschwalbenkolonie | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten   | 2    | NLWKN Brutvögel |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-----------------------|---|------------|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">039</a> | Südwestlich Rahmstorf | Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation / Schwimmblattvegetation   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellen   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">040</a> | Nördlich Rahmstorf    | Überwiegend begradigter Lauf der Goldbeck durch Grünland / Güteklasse II, im Oberlauf z.T. II - III / z.T. Feuchtgrünland / Erlen- und Pappelwäldchen / Fischteiche                             | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit der Entwicklung des Baches und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / Wandergebiet gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">041</a> | Nordwestlich Moisburg | Talraum der Este / überwiegend begradigter Fließgewässerverlauf / Güteklasse II / Grünland mit hohem Anteil von Feuchtgrünland / Feuchtbirke / Seggenrieder / Erlen-Weidenwald / Feuchtgebüsche | Fischotter | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Vogelarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum                                      | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">042</a> | Westlich Moisburg     | Extensive Fischteiche / mäßig entwickeltes Röhricht / randlich Grünland, Acker, Gehölze / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">043</a> | Westlich Moisburg     | Bodensaurer Eichen-Buchenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald / im mittleren und westlichen Teil Schlagflur  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">044</a> | Südwestlich Moisburg  | Eutropher Teich in Viehweide  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">045</a> | Südlich Rahmstorf     | Eutropher Teich im Grünland   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">046</a> | Nordöstlich Moisburg  | Staugewässer / Röhrichtzone / Erlenbruchwald  |            | Gefährdete Vegetationsbestände / möglicher Lebensraum oder Rastgebiet für Röhrichtbrüter und Wasservögel   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">047</a> | Nordwestlich Moisburg | Talraum der Este / begradigter Fließgewässerverlauf / Güteklasse II / Grünland, überwiegend mesophil / Gehölzbestände   | Fischotter | Potentieller Fischotter-Lebensraum / mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">048</a> | Östlich Moisburg      | 2 eutrophe Teiche in Ackerflähe / Schwimmblattvegetation / randliche Gehölze  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">049</a> | Südlich Moisburg      | Begradigter Lauf des Staersbaches durch Grünland / Güteklasse II / wenige Ufergehölze   | Fischotter | Potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit der Entwicklung des Baches und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / mäßig belastetes Fließgewässer                                       | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">050</a> | Südlich Moisburg      | Mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / degenerierter Erlenbruch / Gehölze / Entwässerungsgräben  |            | Pufferzone zum Kerngebiet des Estetalraumes / möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">051</a> | Nördlich Grauen       | Ehemalige Sandabgrabung / offene Sandflächen / Sukzessionswald / Trockenrasenvegetation / Ruderalvegetation / Gebüsch   |            | Gefährdete Vegetationsbestände   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">052</a> | Grauen                | Eutropher Teich in Grünland   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                         | Kurzbeschreibung  | Arten                   | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">053</a> | Südlich Grauen               | Eutropher Teich, umgeben von brachgefallenem Grünland in Ackerfläche / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">054</a> | Südlich Grauen               | Eutropher Tümpel in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze  |                         | Typische Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet von Libellenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">055</a> | Ohlenbüttel                  | 2 eutrophe innerörtliche Teiche / randlich Gebäude, Grünland, Gehölze   |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">056</a> | Ohlenbüttel                  | 2 eutrophe, innerörtliche Teiche / randlich Gebäude, Grünland, Gehölze  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">057</a> | Südlich Eversen              | Oberlauf der Appelbeke / Güteklasse II / im oberen Abschnitt: Seggenrieder / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / Weidengebüsch / zahlreiche intensive Fischteiche |                         | Im oberen Abschnitt: gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / mäßig belastetes Fließgewässer. Im unteren Abschnitt: Wanderraum für Amphibien / naturnahe Entwicklungsmöglichkeit | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">058</a> | Westlich Leversen            | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / z.T. Übergänge zum mesophilen Buchenwald / kaum entwickelte Strauchschicht / schütterere Krautvegetation                      |                         | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 2    | LRP 94, FFH                   |
| <a href="#">059</a> | Westlich Alversen            | Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft  |                         | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">060</a> | Südwestlich Alversen         | Eutropher Tümpel in Ackerfläche / Röhricht / Gehölze / randlich Straße  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">061</a> | Südlich Alvesen              | Findling mit Laubmoos   | <i>Hedwigia ciliata</i> | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                   |
| <a href="#">062</a> | Südlich Vahrendorf           | Größtenteils naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken / Röhrichtgürtel   |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">063</a> | Südlich Vahrendorf           | Eutropher Tümpel im Grünland  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">064</a> | Östlich Sottorf              | Weiher auf Grundstück, das zur Erholung genutzt wird  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">065</a> | Sottorf                      | 2 Weiher am Ortsrand von Sottorf  |                         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">066</a> | Nördlich und südlich Sottorf | Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker                                    |                         | Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere, an Stillgewässer gebundene Lebewesen   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">067</a> | Südwestlich Sottorf          | Besenginsterheide / Brachgrünland   |                         | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Hautflügler   | 2    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage  | Kurzbeschreibung  | Arten                                      | Bedeutung  | Wert | Quelle   |
|---------------------|---|---|--|--|------|--|
| <a href="#">068</a> | Nördlich<br>Sieversen                                     | Eutropher Teich, in Grünland von Ackerflächen umgeben                                   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna                                   |
| <a href="#">069</a> | Nordöstlich<br>Sottorf                                    | Eutropher Teich, umgeben von Brachvegetation  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna                        |
| <a href="#">070</a> | Nordöstlich<br>Sottorf                                    | Weiher in Grünlandfläche  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna                                   |
| <a href="#">071</a> | Westlich<br>Bullenhausen                                  | Graben  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora                                   |
| <a href="#">072</a> | Westlich<br>Bullenhausen                                  | Grünlandgebiet / Gräben   | Weißstorch                                 | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94   |
| <a href="#">073</a> | Elbufer westlich<br>Bullenhausen                          | Flusswatt / Röhricht und Weiden-Auwald  | Deschampsia wibeliana                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten   | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>Flora, LRP<br>94          |
| <a href="#">074</a> | Elbufer nördlich<br>Bullenhausen                          | Vordeichswiesen   | Deschampsia wibeliana, Oenanthe coniooides | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>Flora                     |
| <a href="#">075</a> | Elbufer östlich<br>Bullenhausen                           | Vordeichsgebiet, kleinräumig Weiden-Auwald und Flusswatt / Röhricht                     |  | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten  | 2    | NLWKN<br>Gastvögel                               |
| <a href="#">076</a> | Elbe  | Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe / Röhrichtvegetation / Auwald              |  | Wandergebiet gefährdeter Fischarten / landesweite Bedeutung als Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten  | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna |
| 076b                | Elbe nördlich<br>Winsen                                   | Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe  |  | Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten  | 2    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>LRP 94                    |
| 076c                | Elbe nördlich<br>Winsen                                   | Durch Deiche eingefasster Flusslauf der Elbe  | Oenanthe coniooides                        | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora                                   |
| <a href="#">077</a> | Nordöstlich<br>Meckelfeld,<br>südwestlich<br>Bullenhausen | Großflächiges Grünland / Feuchtgrünland / Nasswiese / durch Straße geteilte Teilflächen | Weißstorch                                 | Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten | 1    | NLWKN,<br>LRP 94                                 |
| <a href="#">078</a> | Elbmarsch bei<br>Kleinmoor                                | Erlenbruchwald / Sumpfgebüsch / Sumpf / Röhricht  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94   |

| ID                  | Lage   | Kurzbeschreibung  | Arten                                      | Bedeutung  | Wert | Quelle                          |
|---------------------|--|---|--|--|------|---------------------------------|
| <a href="#">079</a> | Nordöstlich Meckelfeld, südwestlich Bullenhausen | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland / Graben / Teich / durch Straße geteilte Teilflächen   | Weißstorch                                 | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94                          |
| <a href="#">080</a> | Weiträumig verteilt in der gesamten Elbmarsch    | Überwiegend Grünland  | Weißstorch                                 | Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | Eigene Erhebung                 |
| 080b                | Südöstlich Ramelsloh                             | Extensiv genutztes mesophiles Grünland  | Wiesenvogel, Weißstorch                    | Nahrungshabitat Weißstorch, Lebensraum gefährdeter Wiesenvogel und Heuschrecken  | 1    | Ökokonto Seevetal               |
| <a href="#">081</a> | Südwestlich Bullenhausen                         | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland  | Eisvogel, Weißstorch                       | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten | 1    | LRP 94                          |
| <a href="#">082</a> | Elbmarsch bei Wuhlenburg                         | Elbufer / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Weidengebüsch / Weiden-Auwald   | Deschampsia wibeliana, Oenanthe coniooides | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten   | 1    | NLWKN Gastvögel, Flora, LRP 94, |
| <a href="#">083</a> | Westlich Meckelfeld                              | Erlen-Eschen-Quellwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                          |
| 083b                | Westlich Meckelfeld                              | Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald / Quellgebiet / kleinere Bäche / Staugewässer / kleinere Sumpfwaldgebiete                |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten                       | 2    | LRP 94                          |
| <a href="#">084</a> | Südlich Meckelfeld                               | Gebiet mit kleinen Bachläufen mit z.T. naturnahem Verlauf / Quellhorizonte / Röhrichtvegetation / Grünland / weitgehend naturnahe Mesophile Buchenwälder                                |  | Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten   | 2    | LRP 94                          |
| <a href="#">085</a> | Südlich Meckelfeld                               | Naturnaher Mesophiler Buchenwald mit 2 Tümpeln  |  | Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten   | 2    | LRP 94                          |
| <a href="#">086</a> | Südlich Meckelfeld                               | Gebiet mit kleinen Bachläufen mit z.T. naturnahem Verlauf / Quellhorizonte / Röhrichtvegetation / Grünland / weitgehend naturnahe Mesophile Buchenwälder / Feuchtwälder in der Talsohle |  | Naturnahe Lebensräume in intensiv genutzter Landschaft / Lebensräume für feuchtigkeitsliebende Arten   | 2    | LRP 94                          |
| <a href="#">087</a> | Westlich Meckelfeld                              | Ruderalfläche   |  | Landesweite Bedeutung für Fauna  | 1    | NLWKN Fauna                     |
| <a href="#">088</a> | Nördlich Rangierbahnhof Maschen                  | Auf entwässertem Niedermoorstandort Dauergrünland, z.T. extensiv genutzt / Feuchtgrünland / degeneriertes Erlen-Bruchwäldchen / Gräben  | Weißstorch                                 | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                          |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------------------|--|---|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">089</a> | Nordwestlich Horsten            | See im Großen Moor / Abgrabungssee / Abgrabungsteich / geringe Schwimmblatt- und Röhrichtvegetation / umgeben von kleineren Bruchwaldresten und Marschenwiesen |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop für Wasservogelarten  | 2    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>LRP 94 |
| <a href="#">090</a> | Nordwestlich Horsten            | Erlen-Eschenwald   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">091</a> | Östlich von Meckelfeld          | Pulvermühlenteich, Badeseesee  |   | Rastbiotop für Wasservogelarten   | 2    | NLWKN<br>Gastvögel            |
| <a href="#">092</a> | Nördlich Rangierbahnhof Maschen | Auf entwässertem Moorboden aufwachsender Birkenbestand   |   | Naturnaher Waldbestand  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">093</a> | Nördlich Maschen                | Seeve / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer  |   | Wandergelände gefährdeter Fischarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">094</a> | Nördlich Plack Hörsten          | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland   | Weißstorch  | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbiotop für Wiesen- und Wasservogel / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">095</a> | Südlich Over                    | Feuchtgrünland / Weidenwaldfragment im Norden  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten  | 1    | NLWKN,<br>LRP 94              |
| <a href="#">096</a> | Nordwestlich Stelle             | Seeve-Wiesen / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Abgrabungsgewässer / Brack / Röhricht / Schwimmblattvegetation / Graben                      | Graugans, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Feldlerche, Weißstorch, Schachblume ( <i>Fritillaria meleagris</i> ) | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Rastbiotop zahlreicher Wasservogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>LRP 94 |
| <a href="#">097</a> | Nördlich Maschen                | Seeve / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer  | Graugans, Schwarzhalstaucher, Haubentaucher, Feldlerche   | Wandergelände gefährdeter Fischarten / Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung  | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna     |
| <a href="#">098</a> | Südlich Rosenweide              | Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Graben  | Weißstorch  | Brutgebiet gefährdeter Wiesenvogelarten, Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">099</a> | Nordwestlich Stelle             | Konglomerat aus Feuchtgrünland, Erlenbruchwald, Bracks mit Röhricht und Sumpflandvegetation  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten  | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>LRP 94 |
| <a href="#">100</a> | Elbmarsch, nördlich Fliegenberg | Elbufer / Röhrichtvegetation / Flusswatt / Weidengebüsch / Weiden-Auwald   |   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rast- und Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten   | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>LRP 94 |



| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung   | Arten               | Bedeutung   | Wert | Quelle                             |
|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|------|------------------------------------|
| <a href="#">101</a> | Nördlich Stelle                 | Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Ackernutzung                           |                     | Lokal Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                             |
| 101b                | Nördlich Stelle                 | Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Ackernutzung                           | Weißstorch          | Lokal Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">102</a> | Nördlich Elbstorf               | Elbufer / brach gefallenes Grünland / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Teich                                   |                     | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">103</a> | Nördlich Stove                  | Hartholzauenfragment   |                     | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">104</a> | Nördlich Elbstorf               | Elbufer / Grünland   | Oenanthe coniooides | Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                        |
| <a href="#">105</a> | Nördlich Stove                  | Teich / Gehölze / Pappelforst  |                     | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | Biotopkartierung 2009              |
| <a href="#">106</a> | Nördlich Campingplatz Elbwerder | Vordeichsgebiet / Grünland / Rennbahn / Wiesen / Deich   |                     | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN Gastvögel                    |
| <a href="#">107</a> | Westlich Laßrönne               | Elbufer / mit der Elbe verbundene Stillgewässer / Strandwall / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Weidengebüsch | Weißstorch          | Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94 |
| <a href="#">108</a> | Westlich Laßrönne               | Elbufer / Grünland / Brachgrünland / Röhricht / Hybridpappelforst  | Weißstorch          | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94 |
| <a href="#">109</a> | Nördlich Drennhausen            | Elbufer / Flusswatt / Feuchtgrünland   |                     | Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände   | 2    | Biotopkartierung 2009              |
| <a href="#">110</a> | Drennhausen                     | Siedlungsgebiet  | Tulipa sylvestris   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                        |
| <a href="#">111</a> | Drage                           | Siedlungsgebiet  | Tulipa sylvestris   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                        |
| <a href="#">112</a> | Östlich Drage                   | Abgrabungsstillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände      |                     | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                |
| <a href="#">113</a> | Westlich Elbstorf               | Grünland   | Weißstorch          | Lebensraum gefährdeter Wiesenvögel / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel                    |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle  |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|---|------|---|
| <a href="#">114</a> | Südlich Elbstorf                  | Röhrichtvegetation / Seggenried / Sumpf / Feuchtgebüsch / Teich / Graben                              |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">115</a> | Westlich Krümse                   | Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Röhrichtbrüter   | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">116</a> | Südlich Bulthagen                 | Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet  | Weißstorch  | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch / in Gräben<br>Vorkommen gefährdeter Libellenarten  | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>Brutvögel,<br>Fauna          |
| <a href="#">117</a> | Elbniederung, nördlich Marschacht | Elbvordeichsfläche / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Stillgewässer / Graben                 | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Rastbiotop zahlreicher Wiesen- und Wasservogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Gastvögel,<br>Brutvögel         |
| <a href="#">118</a> | Westlich Rönne                    | Beetgräben / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / eutrophes Stillgewässer                             |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Libellen   | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">119</a> | Westlich Rönne                    | Gräben  |   | Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 2    | NLWKN<br>Fauna                                      |
| <a href="#">120</a> | Südlich Rönne                     | Schwach degenerierter Erlenbruchwald / Schilfröhricht / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Tümpel |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">121</a> | Südlich Niedermarschacht          | Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker                                  | Braunkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Euphorbia palustris             | Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Gräben sind Standorte gefährdeter Pflanzenarten (Euphorbia palustris)  | 2    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Flora, Biotopkartierung 2009 |
| 121b                | Südlich Niedermarschacht          | Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker                                  | Braunkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Euphorbia palustris, Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Gräben sind Standorte gefährdeter Pflanzenarten (Euphorbia palustris) / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Flora, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">122</a> | Südlich Niedermarschacht          | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker  | Euphorbia palustris   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN<br>Flora                                      |
| <a href="#">123</a> | Südlich Niedermarschacht          | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet   | Euphorbia palustris   | Gebiet mit Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten in Gräben  | 2    | Biotopkartierung 2009,<br>NLWKN<br>Flora            |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung   | Arten | Bedeutung  | Wert | Quelle                                |
|---------------------|---------------------------------|--|-------|--|------|---------------------------------------|
| <a href="#">124</a> | Elbniederung, in Obermarschacht | Erlen-Bruchwald / nährstoffreiches Stillgewässer   |       | Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Laichgewässer für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                                |
| <a href="#">125</a> | Östlich Sauensiek               | Sumpfwald und Nasswiese  |       | Potentieller Lebensraum Amphibienarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände  | 2    | Biotopkartierung 2009                 |
| <a href="#">126</a> | Nördlich Holvede                | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gegliedertes Grünland / Grünlandbrache / Teiche / Gräben / artenreiches Feucht- und Nassgrünland  |       | Vorkommen naturnaher Lebensräume / Wandergebietet für Amphibienarten   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">127</a> | Nördlich Regesbostel            | 2 eutrophe Teiche, umgeben von Sumpflvegetation mit wechselndem nährstoffreichen und nährstoffarmen Charakter / mesophiles Grünland  |       | Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">128</a> | Nördlich Regesbostel            | Verlandeter Teich, umgeben von Grünland / ausgedehntes Besenried / Moor- und Sumpflvegetation / teilweise noch wasserführend   |       | Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände   | 1    | Biotopkartierung 2009, NLWKN Gewässer |
| <a href="#">129</a> | Nördlich Regesbostel            | Eutropher Teich / randlich Acker und Grünland / Sumpflvegetation   |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten  | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">130</a> | Nördlich Regesbostel            | Eutropher Teich im Grünland  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">131</a> | Südlich Regesbostel             | Talniederung des Staersbaches mit weitestgehend naturnahem Verlauf / Güteklasse II - III / Grünland, z.T. Feuchtgrünland und Feuchtbrachen / Erlenbruchwälder mit Übergang zum Erlen-Eschenwald / Feuchtgebüsche / Ufergehölze / Fischteiche |       | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / naturnaher Bachverlauf / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">132</a> | Südlich Regesbostel             | Teils begradigter, teils naturnaher Verlauf des Staersbaches durch mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Güteklasse II – III / zahlreiche Ufergehölze  |       | Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Flora und Fauna                                     | 2    | LRP 94                                |
| <a href="#">133</a> | Nördlich Halvesbostel           | Mesophiler Eichen- u. Hainbuchen-Mischwald / Sonstiger Sumpfwald   |       | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | Biotopkartierung 2009                 |
| <a href="#">134</a> | Nördlich Holvede                | Feuchter Laubmischwald / Erlenbruchwald entwässerter Standorte   |       | Vorkommen naturnaher Lebensräume / Wandergebietet für Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                           |
| <a href="#">135</a> | Nordwestlich Regesbostel        | Stark begradigter Abschnitt des Staersbaches, im Wesentlichen durch mesophiles Grünland fließend / Güteklasse III / stellenweise Ufergehölze   |       | Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und des angrenzenden Talraumes zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora                                     | 2    | LRP 94                                |

| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle      |
|---------------------|-------------------------|---|--|---|------|-------------|
| <a href="#">136</a> | Westlich Regesbostel    | Erlenbruchwald und Erlen-Eschenwald, im nördlichen Bereich vom Staersbach durchflossen / Staersbach hier mit naturnahem Verlauf / Güteklasse III / im Süden Erlen-Birkenbruch / geringe Flächenanteile Feuchtbrache |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Fließgewässer mit naturnahem Verlauf  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">137</a> | Nördlich Holvede        | Feuchter Eichen-Hainbuchenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">138</a> | Westlich Holvede        | Bodensaurer und mesophiler Wald / Übergänge vom Bodensauren Eichen-Buchenwald zum Eichen-Hainbuchenwald und Erlen-Eschenwald  |  | Vorkommen seltener Waldgesellschaften / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">139</a> | Östlich Holvede         | Überwiegend degenerierter Birkenbruch mit im mittleren Bereich typischer Vegetationsentwicklung / Teich / Birken- und Kiefernwald entwässertes Moore  |  | Vorkommen seltener Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten (Teich) / Nahrungsgebiet gefährdeter Säugetierarten | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">140</a> | Nordöstlich Hollinde    | Bodensaurer Birken-Eichen-Niederwald  |  | Historische Waldnutzungsform  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">141</a> | Südlich Halvesbostel    | Abgrabung mit Tümpeln / Röhricht-Initialstadien / Schwimmblattvegetation / Sandmagerasen / offene Sandflächen   | Anthericum ramosum   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten   | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">142</a> | Südöstlich Halvesbostel | Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Birken-Eichenwald und Eichen-Hainbuchenwald   | Hepatica nobilis   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, AKN |
| <a href="#">143</a> | Nördlich Hollinde       | Auf entwässertem Moorstandort stockender Kiefern- und Birkenwald in verschiedenen Sukzessionsstadien / Torfstiche / Feuchtgrünland, z.T. extensiv genutzt   | Moorfrosch   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop zahlreicher (Greif-) Vogelarten / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten   | 1    | LRP 94, AKN |
| <a href="#">144</a> | Nördlich Hollinde       | Feuchtwald und Feuchtgrünlandgebiet / Erlenbruch / zum Erlen-Eschenwald degenerierter Erlenbruch / feuchte Grünlandbrache / Sumpf / Feuchtgebüsch   |  | Seltene Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten   | 1    | LRP 94, AKN |
| <a href="#">145</a> | Südöstlich Halvesbostel | Durch Gehölze und kleine Wäldchen gut strukturierter Grünlandbereich / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / degeneriertes Hochmoor / Tümpel / Gehölze / Nadel-Laubmischwald                                       |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">146</a> | Südöstlich Holvede      | Rauhes Moor / naturnahes Hochmoor / Moorheide / Torfstiche / Gehölze / Mischwald  | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis) und Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1987) | NSG: Gefährdete Vegetationsbestände / gefährdete Pflanzenarten / gefährdete Amphibienarten / gefährdete Reptilienarten / gefährdete Libellenarten / gefährdete Schmetterlingsarten            | 1    | LRP 94      |

| ID                  | Lage                       | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                                 |
|---------------------|----------------------------|--|---|---|------|--|
| <a href="#">147</a> | Nordöstlich Hollinde       | Sandabgrabung mit Steilwänden und Teichen / Trockenrasenvegetation / offene Sandflächen  | Kreuzkröte  | Brutbiotop seltener Vogelarten / Vermehrungsgebiet von Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten                               | 2    | LRP 94                                 |
| <a href="#">148</a> | Südlich Hollinde           | Bodensaurer Birken-Eichenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald / südlich der Autobahn ehemalige Sandentnahmestelle / Trockenbrache / Gebüsch                                 |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                                 |
| <a href="#">149</a> | Südlich Halvesbostel       | Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald / Entwässerungsgräben / Tümpel   | Feldlerche, Großer Brachvogel, Kiebitz, Rauchschnalbe, Schwarzstorch  | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                |
| <a href="#">150</a> | Südwestlich Halvesbostel   | Durch Wälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünland / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / Gräben / Gehölze / z.T. Acker | Schwarzstorch, Eisvogel   | Z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche   | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                |
| <a href="#">151</a> | Nördlich Kallmoor          | Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore / Seggen-, Binsen- und Stauden-Sumpf / seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese                                    | Schwarzstorch, Eisvogel   | Nahrungshabitat Schwarzstorch / teilweise naturnahe Lebensräume   | 1    | Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">152</a> | Westlich Kallmoor          | Überwiegend mit Nadelgehölzen bewachsener, degenerierter Hochmoorbereich / Feuchtgebüsch   | Kranich, Feldlerche   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                |
| <a href="#">153</a> | Südwestlich Hollinde       | Grünland / degenerierte Feuchtwälder / Tümpel / Graben / Gehölze   |   | Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                                 |
| <a href="#">154</a> | Südlich Halvesbostel       | Moorheide, im Südtail stark verbuscht  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                                 |
| <a href="#">155</a> | Nördlich Kallmoor          | Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald   | Kornweihe, Schwarzstorch, Eisvogel, Fischotter                        | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotterlebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung eines natürlichen Fließgewässers / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch | 1    | LRP 94                                 |
| <a href="#">156</a> | Nordwestlich Heidenau      | Grünlandgebiet / zahlreiche Tümpel / Gräben / Gehölzstrukturen   | Kiebitz, Großer Brachvogel, Braunkelchen                              | Naturnahe Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop für Wiesenvögel  | 2    | LRP 94, AKN                            |
| <a href="#">157</a> | Süd- und westlich Kallmoor | Nördlicher Teil des Everstorfer Moores / großflächiges, z.T. extensiv genutztes Grünland / Feuchtgrünland / Tümpel / Gräben / Gehölze                                  | Kranich, Feldlerche, Großer Brachvogel, Braunkelchen, Rotrückenvürger | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                |

| ID                  | Lage                      | Kurzbeschreibung   | Arten                                   | Bedeutung  | Wert | Quelle   |
|---------------------|---------------------------|--|---|--|------|--|
| <a href="#">158</a> | Südwestlich Kallmoor      | Nordwestlicher Teil des Everstorfer Moores / Nadel-Laubmischwald / Birkenbruch-Fragmente / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgebüsch / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel   | Kranich, Feldlerche                     | NSG: Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                        |
| <a href="#">159</a> | Südlich Kallmoor          | Nordwestlicher Teil des Everstorfer Moores / Grünland / z.T. Ackernutzung  | Kranich, Feldlerche                     | NSG: Möglichkeit der Entwicklung naturnaher Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">160</a> | Westlich Heidenau         | Everstorfer Moor / Birkenbruch, überwiegend degeneriert / Nadel-Laubmischwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgrünland / Grünland   | Kranich                                 | NSG: Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Lebensraum des Kranichs  | 1    | LRP 94   |
| <a href="#">161</a> | Westlich Heidenau         | Grünlandgebiet / Pfeifengras-Degenerationsstadien / z.T. Acker / Gehölze / Nadelwald / Teiche  | Kiebitz, Großer Brachvogel, Schafstelze | Nahrungsbiotop für Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche  | 2    | LRP 94, AKN                                    |
| <a href="#">162</a> | Westlich Heidenau         | Sandabgrabungen / Abgrabungsgewässer / Röhricht / Sandtrockenrasen / Trockenbrache / offene Sandfläche / Laubmischwald / Nadelforst  |   | Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Rastgebiet für Wasservogelarten  | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009                  |
| <a href="#">163</a> | Westlich Heidenau         | Everstorfer Moor / verlandende Torfstiche / degeneriertes Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch   | Kranich                                 | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Vogelarten / Nahrungs- und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum des Kranichs / Vorkommen gefährdeter Nachtfalter | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                            |
| <a href="#">164</a> | Nordwestlich Wohlesbostel | Talraum des Staersbaches mit großen, z.T. extensiven Fischteichanlagen, östlich der Bahntrasse ist der Staersbach zum Fischteich aufgestaut / Staersbach mit Güteklasse II / Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Erlen- und Eichenbirkenwälder / extensive Teiche mit Schwimmblatt- und Röhrichtvegetation | Fischotter                              | Typische Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 1    | LRP 94   |
| <a href="#">165</a> | Östlich Regesbostel       | Zwergstrauchheide, umgeben von Forst   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände  | 2    | Biotopkartierung 2009                          |
| <a href="#">166</a> | Östlich Regesbostel       | Talniederung des Staersbaches mit überwiegend begradigtem, teils naturnahem Verlauf / Güteklasse II / mesophiles Grünland, z.T. brachgefallen / kleinere Laubwäldchen / Ufergehölze / zahlreiche Fischteiche   | Fischotter                              | Potentieller Fischotter-Lebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung des Bachlaufes und der Talniederung zu einem naturnahen Lebensraum für Fauna und Flora / mäßig belastetes Fließgewässer   | 2    | LRP 94   |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung   | Wert | Quelle                                |
|---------------------|--------------------------|---|------------|---|------|---------------------------------------|
| <a href="#">167</a> | Südlich Wohlesbostel     | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Gehölze / angrenzend Acker  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">168</a> | Südwestlich Wohlesbostel | Tümpel in Grünland / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch   |            | Vermehrungsgebiet von Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">169</a> | Südwestlich Wohlesbostel | Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Erlenbruchwald / quellig / naturnahes Hoch- und Übergangsmoor des Tieflandes / Sonstiger Sumpfwald / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche / Teiche / Feuchtgrünland                                     |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Quellgebiet / potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibien   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">170</a> | Östlich Staersbeck       | Naturnaher Verlauf des Staersbaches durch Grünland / Güteklasse II / z.T. Feuchtgrünland / Ufergehölze / Wäldchen / im oberen Bereich Fischteiche   | Fischotter | Naturnahes Fließgewässer / mäßig belastet / Nahrungsgebiet gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">171</a> | Südlich Moisburg         | Talraum der Este / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtbrachen / Seggenrieder / Erlenbruchwälder / Erlen-Eschenwälder / Feuchtgebüsche / Altarme / Teiche / Entwässerungsgräben / Eichenmischwald | Fischotter | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">172</a> | Nördlich Emmen           | Quellbereich / Bachlauf / Feuchtgebüsch / Sumpf- und Nasswiesenvegetation / kleinere Tümpel / Feuchtgrünland  |            | Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände  | 1    | Biotopkartierung 2009, NLWKN Gewässer |
| <a href="#">173</a> | Östlich Emmen            | Schwach degenerierter Erlenbruch / Übergänge zum Erlen-Eschen- und Eichen-Birkenwald / Feuchtbrache / Feuchtgebüsch / Grünland  |            | Möglichkeit zur Wiederherstellung gefährdeter Waldgesellschaften / naturnahe Lebensräume / Pufferzone zum Kerngebiet des Estetalraumes  | 2    | LRP 94                                |
| <a href="#">174</a> | Westlich Emmen           | Feuchter Eichen-Hainbuchenwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">175</a> | Südlich Emmen            | Bodensaurer Eichen-Buchenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94                                |
| <a href="#">176</a> | Südlich Emmen            | Bodensaurer Eichen-Buchenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">177</a> | Südöstlich Wohlesbostel  | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Gehölze   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">178</a> | Nördlich Hollenstedt     | Bodensaurer Eichen-Buchenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                                |
| <a href="#">179</a> | Südlich Appel            | Unterlauf der Appelbeke, die zu zahlreichen großen Fischteichen aufgestaut ist / Güteklasse II - III / Grünland / Erlenbruch-Fragmente / Röhricht   | Fischotter | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rast- und Brutbiotop für Wasservogel / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                                |
| <a href="#">180</a> | Südwestlich Ohlenbüttel  | Mesotropher Teich in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhricht- und Seggenvegetation  |            | Typische Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher Libellenarten  | 1    | NIWKN Fauna                           |

| ID                  | Lage                       | Kurzbeschreibung  | Arten             | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|----------------------------|---|-------------------|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">181</a> | Südlich Ohlenbüttel        | Eutropher, stark bewachsener Teich in Ackerfläche   |                   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">182</a> | Nördlich Oldendorf         | Seitenbachtal der Appelbeke mit z.T. naturnahem Fließgewässer / Fischteiche / degenerierter Erlenbruch / Grünland, z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Seggenried / Gehölze  |                   | Naturnaher Lebensraum / Möglichkeit zur Entwicklung weiterer naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">183</a> | Östlich Mienenbüttel       | Eutropher Teich im Ackerland, umgeben von schmalen Grünlandstreifen / Röhrichtvegetation  |                   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna, LRP 94           |
| <a href="#">184</a> | Östlich Rade               | Verbuschende Heide / Trockenbrache / offene Sandstellen   |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschrecken / Lebensraum für Hautflügler   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">185</a> | Nordwestlich Emsen         | 4 eutrophe Tümpel im Grünland / z.T. Schwimmblattvegetation / randlich Acker  |                   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">186</a> | Östlich Rade               | Bodensaurer Eichen-Buchenwald, ehem. Niederwaldbewirtschaftung / Strauchschicht / schütterere Krautschicht  |                   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / historische Nutzungsform   | 2    | LRP 94, NLWKN Biotope         |
| <a href="#">187</a> | Westlich Emsen             | Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker  |                   | Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">188</a> | Westlich Hollenstedt       | Torfmooschwingrasen / offene Wasserflächen / Röhrichtvegetation / randlich Gehölze  |                   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">189</a> | Westlich Hollenstedt       | Eutropher Tümpel in Weidegrünland / Schwimmblattvegetation  |                   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">190</a> | Südöstlich Holtorfsborstel | Ehemalige Abbaugrube / Feuchtgebüsch  | Flussregenpfeifer | Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">191</a> | Westlich Hollenstedt       | Grünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Feuchtgebüsch / Graben  |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Libellenarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">192</a> | Südwestlich Hollenstedt    | Grünlandgebiet, z.T. extensiv beweidet, mit zahlreichen alten Eichen / im Westen nährstoffarmer Sumpf mit offenen Wasserflächen / im Norden Erlen-Eichen-Birkenwäldchen, die vom Heidbach durchflossen werden / Güteklasse II |                   | Naturnaher Lebensraum / Standort gefährdeter Pflanzenarten (Sumpf) / Lebensraum gefährdeter Libellenarten (Sumpf) / Nahrungsbiotop von Greifvogelarten / mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Heuschrecken | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">193</a> | Südlich Hollenstedt        | Erlen-Eschenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald und Birken-Eichenwald / Einzelausbildungen relativ kleinflächig und nicht ausgesprochen typisch / Tümpel  |                   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften (fragmentarisch) / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                        |



| ID                  | Lage                                 | Kurzbeschreibung   | Arten      | Bedeutung  | Wert | Quelle      |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------|--|------|-------------|
| <a href="#">194</a> | Südlich Autobahnauffahrt Hollenstedt | Fischteiche  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna |
| <a href="#">195</a> | Südlich Hollenstedt                  | Estetal mit überwiegend begradigtem Estelauf / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Grünland mit hohen Anteilen an Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlen-Eschenwald / Ufergehölze / Gräben          | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">196</a> | Östlich Hollenstedt                  | Aarbachtal mit weitestgehend begradigtem Bachlauf / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / Ufergehölze des Elen-Eschenwaldes / Quellwald / degenerierter Erlen-Bruch / Teiche | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">197</a> | Hollenstedt                          | Talraum der Este / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / zahlreiche Fischteiche / Entwässerungsgräben / Gehölze   | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">198</a> | Südöstlich Hollenstedt               | Rollbachtal mit begradigtem Bachlauf / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Erlenbruchwald / Fischteiche  | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">199</a> | Südlich Dierstorf Heide              | Von kleinem Bachlauf durchflossener Erlen-Eschenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">200</a> | Westlich Wennerstorf                 | Aarbach- und Seitenbachtal mit begradigten Bachläufen / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / kleiner Erlenbruchwald / Pappelwald / Fichtenforst / Fischteiche                               |            | Z.T. naturnahe Lebensräume / Lebens- und Wanderungsräume für Amphibien / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">201</a> | Nördlich Wennerstorf                 | Sandheide / Drahtschmielenbestände   |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">202</a> | Östlich Wennerstorf                  | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Acker und Nadel-Laubmischwald  |            | Gut ausgebildete Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna |
| <a href="#">203</a> | Südöstlich Mienenbüttel              | Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation / randlicher Acker  |            | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna |
| <a href="#">204</a> | Südöstlich Mienenbüttel              | 2 meso- bis oligotrophe Tümpel im Nadel-Laubmischwald / z.T. Röhricht  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94      |

| ID                  | Lage                           | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|--------------------------------|--|--|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">205</a> | Südwestlich Hollenstedt        | Heidbach mit naturnahem Verlauf / Güteklasse II / beweidetes Feuchtgrünland  |  | Naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Brutvogelarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">206</a> | Östlich Hollinde               | Springmoor / Quellmoor / Birkenbruchwald / regenerierte Torfstiche / Feuchtgebüsch / Bachlauf / Nadel-Laub-Mischwald   |  | Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / natürliches Quellgebiet   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">207</a> | Östlich Hollinde               | Randbereich des Springmoores / extensives Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Heidevegetation / Mischwald  |  | Pufferzone für den Kernbereich des Springmoores / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">208</a> | Südwestlich Ochmannsbruch      | Kleinmoor / offene Wasserstellen / Feuchtgrünlandbrache / Graben / randlich Birken-Kiefernwald   | Feuchtwiesen-Perlmuttfalter (Brenthis ino), (1989) | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Schmetterlingsarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">209</a> | Nordöstlich Ochmannsbruch      | Größeres Grünlandgebiet / überwiegend intensiv genutztes Grünland (eingelagert sind mesophile Feuchtwälder und der Perlbach) / z. T. Ackerflächen / Gehölze / Entwässerungsgräben / im Osten Mischwald |  | Pufferzone für eingelagerte Feuchtwälder, den Perlbach und die Esteniederung / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">210</a> | Nördlich Ochmannsbruch         | Überwiegend begradigter Lauf des Perlbaches durch Grünland / Güteklasse II / z.T. Ufergehölze / degenerierte Erlenbruchgehölze / Fischteiche   | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">211</a> | Nordöstlich Ochmannsbruch      | Eichen-Hainbuchenwälder mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald, z.T. Buchen-Eichenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutgebiet gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">212</a> | Nördlich Ochmannsbruch         | Eichen-Hainbuchenwald mit Übergang zum Buchen-Eichenwald (kleinere typische Ausbildungen)  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">213</a> | Südlich Siedlung Ochmannsbruch | Seggernbeek / Betenbach / z.T. naturnah durch Grünland und Gehölzbestände fließender Bach / Güteklasse II / Ufergehölze / Erlenwälder  | Fischotter   | Mäßig belastetes, z.T. naturnahes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">214</a> | Südlich Siedlung Ochmannsbruch | Erlen-Eschenwald / Heidevegetation / Bach / Teiche   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">215</a> | Südöstlich Ochmannsbruch       | Feuchtbrache / Fischteich / Röhricht / Feuchtgebüsch   |  | Naturnahe Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten   | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung   | Arten               | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">216</a> | Westlich Dierstorf              | Rollbachtal mit überwiegend begradigtem Bachlauf / Güteklasse II - III / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Ufergehölze   | Fischotter          | Z.T. naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">217</a> | Westlich Dierstorf              | Vom Rollbach durchflossener Erlen-Eschen- und Erlenbruchwald mit quelligen Standorten / Güteklasse II - III  | Fischotter          | Naturnahes Fließgewässer / Quellbereich / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">218</a> | Östlich Siedlung Ochtmannsbruch | Estetal mit teilweise naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Grünland / geringe Anteile Feuchtgrünlandbrache / geringe Anteile Seggenried / Erlen- und Pappelwälder / Ufergehölze / Fischteiche / Gräben | Fischotter          | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">219</a> | Südwestlich Dierstorf           | Damm und Einschnitt einer ehemaligen Bahntrasse / Sandmagerrasen / Trockenbrache / Gebüsch   |                     | Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">220</a> | Südlich Siedlung Ochtmannsbruch | Verheidete Hochäcker / Trockenrasen / Feuchtheide / Teiche / Bach / Gehölze / Mischwald  | Thesium ebracteatum | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum von Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten               | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">221</a> | Wenzendorf                      | Feuchtgrünland inmitten von Wenzendorf / Feuchtgrünland-Brache / Feuchtgebüsch / Tümpel  |                     | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum für Libellen-Arten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">222</a> | Südlich Klauenburg              | Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Acker  |                     | Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">223</a> | Südwestlich Ochtmannsbruch      | Durch Kleinwälder und Gehölzgruppen gut strukturiertes Grünlandgebiet / eingelagert extensive Teichanlage und Kleinmoor / Feuchtgrünland / Nasswiesen  |                     | Pufferzone für die wertvollen eingelagerten Bereiche / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Heuschrecken  | 2    | LRP 94                |
| 223b                | Südwestlich Ochtmannsbruch      | Grünland   |                     | Lebensraum gefährdeter Heuschrecken   | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">224</a> | Südwestlich Ochtmannsbruch      | Extensiv genutzte Fischteiche / Schwimmblattvegetation / an einer Böschung Feuchtheidevegetation / Feuchtgrünland / Gehölze  |                     | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">225</a> | Südlich Ochtmannsbruch          | Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche   |                     | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Bachlauf naturnah gestalten  | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">226</a> | Südlich Ochtmannsbruch          | Birken-Erlenbruch / Birkenbruch / Erlenbruchwald / Hangquellmoor   |                     | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |

| ID                  | Lage                             | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|----------------------------------|---|------------|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">227</a> | Südöstlich Ochtmannsbruch        | Größeres Grünlandgebiet, durch Gehölzbestände strukturiert / Teiche / Nadelforste   |            | Lebensraum von Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">228</a> | Nördlich Dohren                  | Ehemalige Sandabgrabung / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Trockenbrache / Sandmagerrasen-Fragmente / Heidefragmente / offene Sandstellen / Gehölze   |            | Typische Vegetationszonierung (Wasservegetation) / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">229</a> | Südlich Siedlung Ochtmannsbruch  | Nadelforst / Nadel-Laubmischwald / Aufforstungsfläche   |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">230</a> | Südlich Siedlung Ochtmannsbruch  | Erlenbruchwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald und Birken-Erlenbruch  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">231</a> | Nordwestlich Drestedt            | Estetal mit nahezu naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Seggenried / Sumpf / Feuchtgrünlandbrache / Birken-Erlenbruch / Birkenbruch   | Fischarten | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischarten-Lebensraum                                    | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">232</a> | Westlich Drestedt                | Quelliger Erlen-Eschenwald mit Übergang zum Erlenbruch  |            | Quellbereich / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">233</a> | Nördlich Dohren                  | Mühlenbachtal, Unterlauf / überwiegend, v.a. im Unterlauf naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II - III / Erlen-Eschenwald / Erlenbruch-Fragmente / Grünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Röhricht / kleine Quellmoorbereiche / Feuchtgebüsch / Teiche | Fischarten | Naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischarten-Lebensraum  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">234</a> | Nördlich und südlich Böttersheim | Estetal mit z.T. naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlen-Pappelwald, z.T. Erlenbruch / Teiche / Röhrichte  | Fischarten | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischarten-Lebensraum   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">235</a> | Westlich Böttersheim             | Innerhalb des Böttersheimer Holzes gelegener quelliger Erlen-Bruchwald mit Übergängen zum Birken-Bruchwald und Weidengebüschen, umgeben von Nadelforsten  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                        | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung  | Wert | Quelle              |
|---------------------|-----------------------------|---|------------|--|------|---------------------|
| <a href="#">236</a> | Westlich Böttersheim        | Innerhalb des Böttersheimer Holzes gelegener Buchenwald und Laub-Nadel-Mischwald auf Standort des Bodensauren Eichenmischwaldes, umgeben von Nadelforsten   |            | Standortheimischer Laubwaldbestand / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">237</a> | Östlich Böttersheim         | Erlen-Eschenwald  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">238</a> | Östlich Drestedt            | Eutropher Tümpel im Grünland / randlich Acker   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">239</a> | Nördlich Dohren             | Sandheide, z.T. mit Gehölzen bewachsen / Feuchtheide-Fragment / randlich Kiefernforst   |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">240</a> | Nördlich Dohren             | Mühlenbachtal, Mittellauf / überwiegend begrabtes Fließgewässer / Güteklasse II - III / zahlreiche Fischteiche / Feuchtgrünland / Gehölzbestände z.T. Erlenbruch                                    | Fischotter | Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">241</a> | Nordwestlich von Kakenstorf | Westlich der Este gelegener quelliger Erlen-Birken-Bruchwald, z. T. quellige seggen- und hochstaudenreiche Naßwiese, Weidengebüsch, eingestreut lichter Kiefernbestand mit offenen Sandheideflächen |            | Vorkommen seltener Feuchtvegetationsbestände / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien  | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">242</a> | Westlich von Kakenstorf     | Birken-, z. T. Kiefern-Birken-(Bruch-) Wald innerhalb eines Nadelforstes westlich der Este; Standort z.T. quellig / Weiden- und Gagelgebüsch  |            | Vorkommen seltener Feuchtvegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien  | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">243</a> | Östlich Dohren              | Grünland / z.T. Feuchtgrünland und Feuchtgrünlandbrache / Gräben / randlich Feuchtgebüsch   |            | Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">244</a> | Östlich Dohren              | Trockenbrache mit Anteilen an Heidevegetation und Sandmagerrasen auf Standorten ehemaliger Nadelforsten / z.T. Wiederaufforstung / im Süden kleine Sumpffläche                                      |            | Lebensraum wärmeliebender Heuschreckenarten / Lebensraum von Reptilienarten  | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">245</a> | Südöstlich Böttersheim      | Ausblasungsmulde mit umgebenden Dünen / Tümpel / Moorvegetation / Sumpf / Feuchtgrünland / Trockengebüsch / trockenes Grünland  |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">246</a> | Nördlich Kakenstorf         | Verlandender Tümpel / Feuchtgebüsch   |            | Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum seltener Amphibienarten   | 1    | LRP 94              |

| ID                  | Lage                                    | Kurzbeschreibung  | Arten                           | Bedeutung  | Wert | Quelle      |
|---------------------|---|---|---------------------------------|--|------|-------------|
| <a href="#">247</a> | Nordwestlich Kakenstorf                 | Estetal mit z.T. naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / Seggenried / Sumpf / Erlenbruchwald / Birken-Erlenbruchwald  | Fischotter, Brenthis ino (1987) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibien / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">248</a> | Südlich Kakenstorf                      | Estetal mit weitgehend naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. feucht / Ufergehölz   | Fischotter                      | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94      |
| 248b                | Südlich Kakenstorf                      | Estetal mit weitgehend naturnahem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. feucht / Ufergehölz   | Fischotter, Schwarzstorch       | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">249</a> | Südlich Kakenstorf                      | Talraum des Sprötzer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruchfragmente / Fischteiche / Ufergehölze                    | Fischotter                      | Mäßig belastetes Fließgewässer / z.T. naturnahe Lebensräume / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">250</a> | Nordöstlich Kakenstorf                  | Talraum des nördlichen Zuflusses des Sprötzer Baches, Oberlauf / begradigter Bachlauf / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Seggenried-Fragment / Gehölze                                    |                                 | Z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung weiterer naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">251</a> | Östlich Kakenstorf                      | Talraum des Sprötzerbaches und seines Nebenbaches / begradigtes Fließgewässer / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhricht / schwach degenerierter Erlenbruch / Teiche | Fischotter                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum seltener Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">252</a> | Südöstlich Kakenstorf                   | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet mit überwiegend mesophilem Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Teiche   |                                 | Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">253</a> | Westlich Buchholz                       | Ehemalige Bahntrasse / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte / Trockenbrache / Besenginster-Heide / Tümpel  |                                 | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilienarten  | 2    | LRP 94      |
| <a href="#">254</a> | Innerhalb des Staatsforstes Rosengarten | Tümpel  |                                 | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna |
| <a href="#">255</a> | Nördlich Langenrehm                     | Besenginster-Heide / wenige Gehölze   |                                 | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum wärmeliebender Tierarten  | 1    | LRP 94      |
| <a href="#">256</a> | Südwestlich Langenrehm                  | Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald   |                                 | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna |
| <a href="#">257</a> | Südwestlich Langenrehm                  | Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald   |                                 | Vermehrungsgebiet seltener Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna |

| ID                  | Lage                   | Kurzbeschreibung  | Arten | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|------------------------|---|-------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">258</a> | Südlich Langenrehm     | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation   |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">259</a> | Südwestlich Langenrehm | Eutropher Tümpel im Grünland / benachbart Nadel-Laubmischwald   |       | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">260</a> | Südlich Langenrehm     | Eutropher Tümpel im Grünland / randlich Acker   |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">261</a> | Südlich Sieversen      | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / zeitweise wasserführendes Regenrückhaltebecken / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">262</a> | Südlich Tötensen       | Bodensaurer Nadel-Laubmischwald / im südlichen Abschnitt bachbegleitender Erlenbruchwald  |       | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / im Erlenbruchwald Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">263</a> | Westlich Metzendorf    | Feuchtgrünland auf Staunässeboden / Brachvegetation / Feuchtgebüsch   |       | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">264</a> | Westlich Emmelndorf    | 2 durch einen Damm getrennte Teiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich Acker und Grünland                             |       | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Reptilienarten | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">265</a> | Nordwestlich Emsen     | Tümpel im Acker   |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">266</a> | Westlich Emsen         | Eutropher Tümpel im Nadelforst  |       | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">267</a> | Nördlich Nenndorf      | 3 Teiche / teilweise Schwimmblattvegetation   |       | Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">268</a> | Nördlich Nenndorf      | Flach abfallender, naturnaher Teich   |       | Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">269</a> | Nordöstlich Nenndorf   | Gebiet mit hoher Dichte meist eutropher Stillgewässer / überwiegend Nadelholzbestände / z.T. Nadel-Laubmischwälder / Acker                  |       | Gute Möglichkeiten eines Genaustausches durch wandernde Amphibienarten und andere an Stillgewässer gebundene Lebewesen  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">270</a> | Östlich Iddensen       | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">271</a> | Südlich Hinteln        | Eutropher Teich in Ackerfläche  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">272</a> | Östlich Nenndorf       | Teich in feuchter Brachfläche   |       | Potentieller Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">273</a> | Nördlich Hittfeld      | Siedlungsnaher Teich / Röhrichtvegetation   |       | Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">274</a> | Westlich Hittfeld      | Bachniederung, überwiegend begradigtes Fließgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Teich             |       | Z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung  | Arten            | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|-----------------------|---|------------------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">275</a> | Südwestlich Eckel     | Naturnah angelegter Teich am Grund einer Sandgrube / Flachwasserzone / Röhrichtentwicklung                          |                  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">276</a> | Südlich Eckel         | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation  |                  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">277</a> | Östlich Neu-Eckel     | Eutropher Teich, umgeben von Acker und Grünland / Röhrichtvegetation  |                  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten   | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">278</a> | Südlich Lindhorst     | Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Tümpel  | Weißstorch       | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellen / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">279</a> | Nördlich Steinbeck    | Feuchtgrünland / Seggenried / Sumpfvvegetation / degenerierter Erlenbruch mit einigen Hybridpappeln / Feuchtgebüsch |                  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| 279b                | Nördlich Steinbeck    | Grünland / Ruderalflächen   |                  | Puffergebiet zwischen hochwertigen Bereichen im N und O / Wandergebiet für Amphibienarten   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">280</a> | Nordöstlich Buensen   | Tümpel innerhalb eines Feldgehölzes, umgeben von Ackerland  |                  | Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung  | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">281</a> | Westlich Buensen      | Eutropher Teich / randlich Gehölze  |                  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">282</a> | Südwestlich Neu-Eckel | Kleiner Tümpel in Ackerfläche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation   |                  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">283</a> | Eickstüve             | Dorfweiher, umgeben von alten Hofeichen   |                  | Lebensraum für gefährdete Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">284</a> | Südöstlich Neu-Eckel  | Eutropher Teich im Wald / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation   |                  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">285</a> | Westlich Bendestorf   | Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil  |                  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                |
| 285b                | Westlich Bendestorf   | Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil  | Hedwigia ciliata | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">286</a> | Bendestorf            | Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Röhricht / Bachlauf / Intensiv-Fischteiche / Angelteich                         |                  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">287</a> | Buchholz              | Steinbach im besiedelten Bereich / Güteklasse III / im unteren Bereich Teich  |                  | Wander- und Lebensraum für Amphibien- und Fischarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">288</a> | Nördlich Suerhop      | Ruderalfläche an Bahnstrecke  |                  | Potentieller Lebensraum für Reptilien und potentieller Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | Biotopkartierung 2009 |



| ID                  | Lage                          | Kurzbeschreibung   | Arten                                | Bedeutung  | Wert | Quelle                |
|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|------|-----------------------|
| <a href="#">289</a> | Südlich Buchholz              | Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / Feuchtgrünland-Brache / Sumpf   |                                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">290</a> | Nördlich Suerhop              | Ruderalfläche an Bahnstrecke   | Chenopodium murale, Hyoscyamus niger | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">291</a> | Östlich Buchholz              | Teich, umgeben von Grünland / Röhrichtvegetation   |                                      | Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">292</a> | Östlich Buchholz              | Mesotropher Tümpel, umgeben von Grünland / Röhrichtvegetation  |                                      | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">293</a> | Südlich Güterbahnhof Buchholz | Lagerfläche  | Acinos arvensis                      | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">294</a> | Nordwestlich Itzenbüttel      | Teiche im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation   |                                      | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Libellenarten | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">295</a> | Nordwestlich Itzenbüttel      | Waldtümpel   |                                      | Lebensraum für gefährdete Amphibien- und Reptilienarten  | 1    | NLWKN Fauna           |
| <a href="#">296</a> | Südwestlich Itzenbüttel       | Teich in einem Feldgehölz, umgeben von Ackerland   |                                      | Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit weiteren Teichen der Umgebung   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">297</a> | Südwestlich Itzenbüttel       | Eutropher Teich in Ackerland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen                    |                                      | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Vernetzung                            | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">298</a> | Südöstlich Bendestorf         | Birkenbruchwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel / kleiner Bach   |                                      | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">299</a> | Südlich Bendestorf            | Bachtal mit aufgestauten Fischteichen / Quellbereich / Bach-Erlen-Eschenwald-Fragmente / Nadel-Laubmischwald                                     |                                      | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">300</a> | Westlich Ramelsloh            | Tal der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Acker / Tümpel / Ufergehölze | Weißstorch                           | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch                   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |

| ID                  | Lage                   | Kurzbeschreibung   | Arten                       | Bedeutung   | Wert | Quelle                             |
|---------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|------|------------------------------------|
| <a href="#">301</a> | Südöstlich Bendestorf  | Erlen-Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlenbruch und Erlen-Eschenwald sowie zum Birkenbruchwald / extensiver Fischteich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation |                             | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten       | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">302</a> | Südlich Buchholz       | Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / Grünland / Teiche / angrenzend Siedlungsgebiet und Sportfläche  |                             | Möglicher Lebens- und Wanderraum für Amphibien- und Fischarten  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">303</a> | Südlich Buchholz       | Trockenbiotop entlang der Bahnlinie / Heidevegetation / Trockenbrache / Sandtrockenrasen   |                             | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009      |
| <a href="#">304</a> | Südlich Buchholz       | Steinbach-Tal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse III / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Graben / Teich          |                             | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">305</a> | Östlich Buchholz       | Tümpel, umgeben von landwirtschaftlichen Flächen   |                             | Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten / Möglichkeit zur Vernetzung mit umgebenden Wäldern   | 2    | Biotopkartierung 2009              |
| <a href="#">306</a> | Südlich Reindorf       | Tal des Reindorfer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / Tal des Reindorfer Baches, Unterlauf / begradigtes Fließgewässer / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch |                             | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">307</a> | Nördlich Seppensen     | Tal des Steinbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtwälder / Feuchtgebüsch   |                             | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">308</a> | Südlich Reindorf       | Tal des Reindorfer Baches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II - III / Feuchtgrünland / Hybridpappel-Erlenwald  |                             | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">309</a> | Nördlich Jesteburg     | Kleine siedlungsnaher Heidefläche / Sandheide / Sandmagerrasen   |                             | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">310</a> | Nordwestlich Jesteburg | Auwaldrest / Nasswiese   | <i>Dactylorhiza majalis</i> | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                        |
| <a href="#">311</a> | Südwestlich Jesteburg  | Bachtal mit zahlreichen aufgestauten Fischteichen / Schwimmblattvegetation / Bachlauf / Gehölzbestand / Grünland   |                             | Quellgebiet / Lebensraum für Libellenarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">312</a> | Südwestlich Jesteburg  | Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / Feuchtgebüsch / Bach / Teich / Graben                                  |                             | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">313</a> | Nördlich Jesteburg     | Naturnaher Bach / Sumpfvegetation / Landröhricht   | <i>Dactylorhiza majalis</i> | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora, Biotopkartierung 2009 |

| ID                  | Lage                | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------|---|------------|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">314</a> | Nördlich Asendorf   | Überwiegend mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben / Kleinwälder / Gehölzreihen / Teiche                  | Weißstorch | Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch                            | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">315</a> | Südlich Jesteburg   | Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Fischteiche / Ufergehölze / im Unterlauf randlich Straße          |            | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">316</a> | Südlich Jesteburg   | Erlenbruchwald mit Übergängen zum Erlen-Eschenwald / Grünland   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">317</a> | Südlich Jesteburg   | Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Fischteiche / Ufergehölze / im Unterlauf randlich Straße          |            | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">318</a> | Südlich Glüsing     | Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben  |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">319</a> | Südlich Glüsing     | Durch Gehölzreihen gut strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Nadelforst |            | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">320</a> | Südlich Fleestedt   | Bodensaurer Buchenwald im Übergang zum mesophilen feuchten Eichen-Hainbuchenwald  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">321</a> | Westlich Jehrden    | Feuchtgrünlandbrache / degenerierter Erlenbruch / Tümpel  |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">322</a> | Östlich Emmelndorf  | Durch Gehölzbestände gut gegliedertes Grünlandgebiet / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Gebüsch / Kleinwälder / kleiner Bach / Teich   |            | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">323</a> | Maschen             | Grünland / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Gehölzbestände / Tümpel                                |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">324</a> | Maschen             | 2 Teiche / Röhricht / Seggenried / Feuchtgebüsch / Erlen-Birken-Bestände  |            | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Heuschreckenarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">325</a> | Nordöstlich Maschen | Klärteiche des Rangierbahnhofs Maschen / offene Wasserstellen / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Weidenwald                      |            | Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">326</a> | Östlich Maschen     | Regenrückhaltebecken / Tümpel / Röhricht / Feuchtgrünland   |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten   | 2    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung   | Arten                | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">327</a> | Östlich Maschen                   | Erlen- und Birkenbestände auf entwässertem Moorboden / brach gefallenes Feuchtgrünland / Feuchtgrünland / Sumpf / Tümpel / offener Moorboden |                      | Naturnahe Lebensräume / wertvolles Pionierstadium / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum und Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum für zahlreiche wärmeliebende Insektenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">328</a> | Östlich Maschen                   | Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Eichen-Hainbuchenwald   |                      | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">329</a> | Östlich Maschen                   | Baggersee mit Flachwasserzone / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / randlich trockenes Grünland / Gebüsch                          |                      | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">330</a> | Östlich Maschen                   | Birkenwald auf entwässertem Moorboden  |                      | Naturnaher Lebensraum   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">331</a> | Westlich Stelle                   | Kleines Eichen-Hainbuchen- / Erlen-Eschenwäldchen  |                      | Vermehrungsgebiet gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">332</a> | Westlich Stelle                   | Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Graben  |                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">333</a> | Nördlich Stelle, am Achtern-deich | 3 Bracks mäßig naturnah, Schwimmblattvegetation, teilweise Ufergehölze   |                      | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">334</a> | Nördlich Stelle                   | Mühlenbach / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer   |                      | Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">335</a> | Nördlich Stelle                   | Brack / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände  |                      | Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">336</a> | Nördlich Stelle                   | Deich  | Allium scorodoprasum | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">337</a> | Südlich Fliegenberg               | 3 Bracks / 1 verlandendes Brack / Sumpfvegetation / Grünland / Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Entwässerungsgraben                     |                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">338</a> | Nördlich Stelle                   | Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Graben  | Weißstorch           | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">339</a> | Nördlich Stelle                   | Großes und kleines Brack / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland  | Weißstorch           | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">340</a> | Nördlich Stelle                   | Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland   |                      | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten   | 2    | Biotopkartierung 2009 |

| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle          |
|---------------------|-------------------------|---|---|---|------|-----------------|
| <a href="#">341</a> | Nördlich Stelle         | Wettern / Entwässerungsgräben / randlich überwiegend Grünlandnutzung / z.T. Acker-nutzung   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">342</a> | Elbufer nördlich Winsen | Vordeichswiesen   | Deschampsia wibeliana   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora     |
| <a href="#">343</a> | Nördlich Ashausen       | Grünlandgebiet mit Gehölzen, teilweise Feuchtgrünland   | Bekassine, Feldlerche, Weißstorch   | Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">344</a> | Östlich Hittfeld        | Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / randlich Siedlung   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94          |
| 344b                | Östlich Hittfeld        | Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried  | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">345</a> | Östlich Hittfeld        | NSG "altes Moor" / Birkenbruchwald / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Torfstich / Abgrabungsgewässer | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Rastbiotop für Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">346</a> | Westlich Horst          | Abgrabungsgewässer / Röhrichtvegetation / Pioniervegetation / Gehölzvegetation  | Biber   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum des Bibers / Lebensraum gefährdeter Brutvögel   | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">347</a> | Lindhorst               | Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Teich   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten  | 2    | LRP 94          |
| <a href="#">348</a> | Westlich Stelle         | Erlenbruchwald / Birken-Eichenwald / Eichen-Buchenwald / Quellbereich / Teich   |   | Vorkommen gefährdeter Waldbestände / Quellbereich   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">349</a> | Westlich Stelle         | Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Graben / Teich / randlich Nadel-Laubmischbestände   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten   | 2    | LRP 94          |
| 349b                | Westlich Stelle         | Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Graben / Teich  | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">350</a> | Westlich Stelle         | NSG Stembruch / Birken-Eichenwald / Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald / Erlenbruchwald / Hochmoorvegetation  | Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris) und Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1980) | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten   | 1    | LRP 94          |
| <a href="#">351</a> | Westlich Stelle         | Brach gefallenes Grünland / alte Obstwiese / am Bahndamm Sandtrockenrasenvegetation   |   | Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Standort gefährdeter Vegetationsbestände   | 2    | LRP 94          |

| ID                  | Lage                   | Kurzbeschreibung  | Arten                    | Bedeutung   | Wert | Quelle                             |
|---------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------|------------------------------------|
| <a href="#">352</a> | Südwestlich Stelle     | Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Teich / kleiner Bach   |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">353</a> | Östlich Horst          | Birken-Eichenwald im Übergang zum Erlen-Birkenbruchwald   |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">354</a> | Südwestlich Stelle     | Birken-Eichenwald / Eichen-Hainbuchenwald / Tümpel  |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">355</a> | Nördlich Stelle        | Großflächiges Grünlandgebiet / Entwässerungsgräben / Schwimmblattvegetation / Feucht- und Nassgrünland / kleine Gehölzbestände  | Schwarzmilan, Weißstorch | Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und Greifvögel / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94, VK LKH                     |
| <a href="#">356</a> | Nördlich Stelle        | Mühlenbach / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer  |                          | Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">357</a> | Stelle                 | Waldgebiet mit Graben und kleineren Teichen   |                          | Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Lebensraum für Amphibien  | 2    | NLWKN Fauna, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">358</a> | Nordöstlich Stelle     | Abschnitt eines Entwässerungsgrabens / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation  |                          | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">359</a> | Nördlich Ashausen      | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen  |                          | Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten   | 2    | NLWKN Brutvögel, teils LRP 94      |
| 359b                | Nördlich Ashausen      | Grünland  | Weißstorch               | Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, teils LRP 94      |
| <a href="#">360</a> | Östlich Harmstorf      | Seeveniederung / großflächiges Grünlandgebiet, z.T. durch Kleinwälder strukturiert / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Heidefragmente / degenerierter Erlenbruch / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Graben / Tümpel / Fischteich / z.T. Acker | Weißstorch               | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Landschaftsräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Heuschreckenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94                             |
| 360b                | Östlich Harmstorf      | Seeveniederung / quelliger Erlen-Eschenwald   |                          | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                        |
| <a href="#">361</a> | Nordwestlich Ramelsloh | Für den Biotopschutz angelegte Kleingewässer / Schwimmblattpflanzen / Grünlandbrache / Gehölze  | Weißstorch               | Entwicklung naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94, VK LKH                     |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                             |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|------|------------------------------------|
| <a href="#">362</a> | Nordöstlich Harmstorf | Orchideenwiese Harmstorf / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Erlen-Birkenbruchwald                                   | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">363</a> | Östlich Harmstorf     | Bachlauf im Laubwald / Erlenbruchwald / ehem. Fischteiche, brach gefallen   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">364</a> | Westlich Maschen      | Begradigter und eingedeichter Lauf der Seeve / Güteklasse II / Grünland   |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für gefährdete Fischarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna                |
| 364b                | Westlich Maschen      | Begradigter und eingedeichter Lauf der Seeve / Güteklasse II / Grünland   | Weißstorch   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für gefährdete Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                |
| <a href="#">365</a> | Südlich Horst         | Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Quellgebiet / begradigter Bachlauf / Gehölzbestände  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">366</a> | Südlich Horst         | Lüchtmoor / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Erlen-Birkenbruchwald / Feuchtgebüsch / begradigter Bachlauf / Graben | Weißstorch, Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1988) | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Weißstorch          | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">367</a> | Südwestlich Stelle    | Ehemalige Ziegeleigruben / Abgrabungsteiche / Röhricht / degenerierter Erlen-Bruchwald / Birken-Eichenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum und Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 2    | LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">368</a> | Nordöstlich Ohlendorf | Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Nadel-Laubmischwald   |  | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">369</a> | Südlich Stelle        | Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlen-Birken-Eichenwald und Eichen-Buchenwald / Tümpel   |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">370</a> | Nordöstlich Ohlendorf | Mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Bachlauf  |  | Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">371</a> | Nordöstlich Ohlendorf | Entwässerungsgraben im Kiefern-Fichtenforst   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">372</a> | Westlich Ashausen     | Ehemaliges Sandabbaugebiet / Gebüsch / Abgrabungsgewässer / Pionier- und Sumpfwald  |  | Vermehrungsbiotop gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">373</a> | Westlich Ashausen     | Ehemaliges Sandabbaugebiet / offene Sandbereiche / Trockenrasenvegetation / Trockenbrache   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                             |

| ID                  | Lage                           | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|--------------------------------|---|------------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">374</a> | Ashausen                       | Tal des Ashauser Mühlenbaches / durch Siedlungsgebiet fließendes, begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II   |            | Mäßig belastetes Fließgewässer  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">375</a> | Südwestlich Ashausen           | Birken-Eichenwald im Übergang zum Eichen-Buchenwald / feuchter, mesophiler Eichen-Hainbuchenwald  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">376</a> | Südlich Ashausen               | Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">377</a> | Luhenederung, östlich Ashausen | Grünland / Feuchtgrünland   | Weißstorch | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Weißstorches  | 1    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">378</a> | Luhenederung, östlich Ashausen | Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / z.T. Intensiv-Grünland   | Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">379</a> | Südlich Ashausen               | Grünland  | Weißstorch | Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">380</a> | Östlich Harmstorf              | Erlenbruchwald im Übergang zum Erlen-Eschenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">381</a> | Südöstlich Harmstorf           | Seeenederung / Grünlandgebiet, z.T. durch Kleinwälder strukturiert / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Heidefragmente / degenerierter Erlenbruch / Erlen-Eschenwald / Birken-Eichenwald / Graben / Tümpel / Fischteich / z.T. Acker | Weißstorch | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Landschaftsräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Heuschreckenarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">382</a> | Nördlich Ramelsloh             | Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Feuchtgrünland  |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">383</a> | Nördlich Holtorfsloh           | Böschung mit Trockenvegetation / Gebüsch  |            | Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">384</a> | Nördlich Holtorfsloh           | Sandtrockenrasen  |            | Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">385</a> | Nordöstlich Holtorfsloh        | Tal des Ashauser Mühlenbaches / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschenwald / Grünland / Tümpel   |            | Mäßig belastetes, naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Flora   |
| <a href="#">386</a> | Nördlich Holtorfsloh           | Tümpel im Grünland / Sumpf  |            | Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">387</a> | Nordöstlich Holtorfsloh        | Eutropher Teich / Schwimmblattvegetation / Feuchtbrache / Nadel-Laubmischwald   |            | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 2    | LRP 94                |



| ID                  | Lage                             | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle                |
|---------------------|----------------------------------|---|---|--|------|-----------------------|
| <a href="#">388</a> | Nördlich Holtorsloh              | Oberlauf des Ashauser Mühlenbaches / begrabtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / größtenteils degenerierter Erlenbruchwald / Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände / Fischteiche |   | Quellgebiet / gering belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">389</a> | Nordöstlich Holtorsloh           | Von Wald umgebenes Grünlandgebiet / Feuchtgrünland  |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">390</a> | Südwestlich Ashausen             | Ehemaliges Toteisloch / Torfmoos-Schwingrasen / Birkenbruchwald   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">391</a> | Südwestlich Ashausen             | Mehrere Tümpel in ehemaliger Sandabgrabung und Motorrennplatz   |   | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 2    | LRP 94, FFH           |
| <a href="#">392</a> | Südlich Ashausen                 | Mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                |
| 392b                | Südlich Ashausen                 | Eichen-Buchenwald / Feuchtgrünland / Grünland / Ruderalflächen / Fischteiche  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Standorte  | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">393</a> | Westlich Scharmbeck              | Mesophiles Nadel-Laubmischwald-Gebiet / extensives Grünland / Feuchtgrünland  |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume, insbesondere Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">394</a> | Westlich Scharmbeck              | Mesophiler Eichen-Hainbuchen-Niederwald / kleiner Erlenbruch / Tümpel   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / kulturhistorische Waldnutzungsform / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">395</a> | Westlich Scharmbeck              | Bodensaurer Birken-Eichenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Tonabgrabung / Teich / Röhrichtvegetation / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte                         |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">396</a> | Westlich Scharmbeck              | Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald mit Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">397</a> | Südwestlich Scharmbeck           | Sandtrockenrasen / Gehölzaufwuchs   |   | Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">398</a> | Luhenederung, östlich Scharmbeck | Durch Straße geteiltes, großflächiges Grünlandgebiet / Erlenbruch-Fragmente / Gehölzreihen / naturnah gestaltetes Regenwasser-Rückhaltebecken   | Großer Brachvogel (1999), Heidelerche, Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| 398b                | Luhenederung, östlich Scharmbeck | Durch Straße geteiltes, großflächiges Grünlandgebiet / Erlenbruch-Fragmente / Gehölzreihen / naturnah gestaltetes Regenwasser-Rückhaltebecken   | Großer Brachvogel (1999), Heidelerche             | Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">399</a> | Winsen                           | Bachlauf der Schirmbeck   |   | Lebensraum für Libellenarten   | 2    | NLWKN Fauna           |

| ID                  | Lage                               | Kurzbeschreibung   | Arten                    | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------|-------------------------------|
| 399b                | Winsen                             | Bachlauf der Schirmbeck  |                          | Lebensraum für Libellenarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna, Flora         |
| <a href="#">400</a> | Winsen                             | Sandabbaugewässer  |                          | Lebensraum für Libellen- und Nachtfalterarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | NLWKN<br>Fauna                |
| <a href="#">401</a> | Südlich<br>Ramelsloh               | Trockene Grünlandbrache, z.T. mit Sandmagerasen / Ruderalvegetation / Gebüsche / umgeben von Ackerflächen                          |                          | Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">402</a> | Südwestlich<br>Ramelsloh           | Naturnah angelegter Teich, umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen  |                          | Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 1    | NLWKN<br>Fauna                |
| <a href="#">403</a> | Südwestlich<br>Ramelsloh           | Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Tümpel / Feuchtgrünland  |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">404</a> | Südlich<br>Ramelsloh               | Verbuschender Sandmagerrasen   |                          | Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">405</a> | Nordwestlich<br>Marxen             | Feuchter Birken-Eichenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / Graben   |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">406</a> | Nördlich<br>Marxen                 | 2 Teiche, umgeben von Grünland   |                          | Potentieller Lebensraum für gefährdete Amphibienarten   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">407</a> | Südlich<br>Ramelsloh               | Sandtrockenrasen / Sandheide   |                          | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">408</a> | Südöstlich<br>Holtorfslöh          | Trockener Birken-Eichenwald mit einzelnen Kiefern / angrenzend alter lichter Kiefernwald   |                          | Lebensraum für Reptilienarten / Lebensraum wärme-liebender Insektenarten  | 2    | LRP 94,<br>FFH                |
| <a href="#">409</a> | Westlich<br>Pattensen              | Traubeneichen-Buchen-Niederwald mit einzelnen Kiefern  |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / kulturhistorische Nutzungsform   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">410</a> | Luhenederung,<br>östlich Pattensen | Großflächiges Grünlandgebiet / z.T. Acker / Gehölzbestände   | Großer Brachvogel (1999) | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten   | 2    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel |
| <a href="#">411</a> | Südwestlich<br>Marxen              | Tal mit begradigtem Bachlauf / mesophiles Grünland / Feuchtgrünlandbrache  |                          | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">412</a> | Westlich<br>Marxen                 | Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlen-Eschenwald / Teich | Fischotter, Weißstorch   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch                | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">413</a> | Nördlich<br>Brackel                | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Gehölze  |                          | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten | 1    | NLWKN<br>Fauna                |
| <a href="#">414</a> | Nördlich<br>Brackel                | Birken-Eichenwald mit Übergängen zum bodensauren Buchenwald und Eichen-Hainbuchenwald  |                          | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung   | Arten             | Bedeutung  | Wert | Quelle                                    |
|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|------|---|
| <a href="#">415</a> | Nördlich Brackel                  | Trockenvegetation an einem Bahndamm  | Genista tinctoria | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten   | 1    | NLWKN Flora                               |
| <a href="#">416</a> | Nördlich Brackel                  | Eutropher Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände / randlich Acker                                   |                   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                       |
| <a href="#">417</a> | Östlich Brackel                   | Bodensaurer Birken-Eichenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald  |                   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 1    | LRP 94, FFH                               |
| <a href="#">418</a> | Östlich Thieshope                 | Bodensaurer Eichen-Buchenwald  |                   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009        |
| <a href="#">419</a> | Marxen-Bahlburg                   | Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch                              |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung  | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">420</a> | Südwestlich Pattensen             | Grünlandgebiet / überwiegend mesophiles Grünland / z.T. Intensiv-Grünland / Tümpel / Gehölzbestände  |                   | Möglicher Wander- und Lebensraum für Amphibienarten / Möglichkeiten zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">421</a> | Westlich Wulfen                   | Feuchter Laubwald  |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora                               |
| <a href="#">422</a> | Westlich Wulfen                   | Tal eines begradigten Baches / Quellgebiet / Grünland / Feuchtgrünland / Eichen-Hainbuchenwald-Fragmente / Tümpel                              |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum heimischer Brutvögel  | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">423</a> | Marxen-Bahlburg                   | Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch                              |                   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung  | 2    | LRP 94, FFH                               |
| <a href="#">424</a> | Nördlich Wulfen                   | Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Gebüsch / Nadelholzbestände   |                   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilien- und Schmetterlingsarten  | 1    | NLWKN Fauna, Kartierung Pattensen-Luhdorf |
| <a href="#">425</a> | Luhenniederung, westlich Bahlburg | NSG Laßbrook / mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald  |                   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">426</a> | Luhenniederung, westlich Bahlburg | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland  | Fischotter        | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94, FFH                               |
| <a href="#">427</a> | Nördlich Wulfen                   | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände / Fischteiche | Fischotter        | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Nahrungsbiotop für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum heimischer Brutvögel | 2    | LRP 94, FFH                               |

| ID                  | Lage                       | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                                    |
|---------------------|----------------------------|--|--|---|------|---|
| <a href="#">428</a> | Nördlich Garstedt          | Grünland / Grünlandbrache / entwässerter Erlenwald   |  | Möglichkeit zur Vernetzung hochwertiger Lebensräume   | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">429</a> | Elbmarsch, nördlich Winsen | Elbufer / Röhrichtvegetation / Flusswatt / Gehölzbestände  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Rast- und Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel, NLWKN Gastvögel, LRP 94  |
| <a href="#">430</a> | Nördlich Laßrönne          | Elbufer / Röhrichtvegetation / brach gefallenes Feuchtgrünland / Flusswatt / Gehölzbestände                |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände  | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">431</a> | Westlich Laßrönne          | Durch Eindeichung von Überflutung abgeschnittener Auwaldrest / Altbäume                                    |  | Gefährdete Waldgesellschaft / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände   | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">432</a> | Westlich Laßrönne          | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland  | Weißstorch   | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                           |
| <a href="#">433</a> | Westlich Laßrönne          | Großer Bodenentnahmesee / z.T. Ufergehölze   |  | Lebensraum für Wasservogelarten / Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung   | 2    | Biotopkartierung 2009                     |
| <a href="#">434</a> | Südlich Drage              | Straßenbegleitende Röhrichtzone / Graben / Gehölzbestände  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">435</a> | Südlich Drage              | Nährstoffreiches Stillgewässer / Röhricht / Pioniervegetation wechsellasser Standorte / Weidengebüsch      |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">436</a> | Südlich Drage              | Grünland, z.T. brach gefallen / Acker / Tümpel / Gehölze   | Weißstorch   | Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94        |
| <a href="#">437</a> | Nördlich Laßrönne          | Elbufer / Flusswatt / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch / Stillgewässer | Weißstorch, <i>Althaea officinalis</i>   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Amphibienarten / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94        |
| <a href="#">438</a> | Südlich Drage              | Tonkuhlen / eutrophe Stillgewässer / Schwimmbblattvegetation / Röhrichtvegetation / Erlenbruchwald         | Zwerg- und Höckerschwan, Graugans, Kanadagans, Schnatterente, Spießente, Löffelente, Reiherente, Gänsesäger, Regenbrachvogel | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Libellenarten | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, Fauna, LRP 94 |
| <a href="#">439</a> | Östlich Laßrönne           | Tümpel und Teiche in landwirtschaftlich genutzter Fläche / Röhricht / Gehölzbestände / Feuchtgebüsch       | Weißstorch   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94        |

| ID                  | Lage                | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle                             |
|---------------------|---------------------|---|---|--|------|------------------------------------|
| <a href="#">440</a> | Nördlich Eggerslust | Beetgräben / Röhrichtvegetation / kleinflächig Gehölzbestände                     | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">441</a> | Östlich Laßrönne    | Röhrichtvegetation / Grünland   | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94 |
| <a href="#">442</a> | Östlich Eggerslust  | Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / Röhricht / Feuchtgebüsch / Teich / Tümpel | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel                          | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs-<br>gebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibien-<br>arten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Vo-<br>gelarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten                                 | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel, LRP 94 |
| <a href="#">443</a> | Östlich Laßrönne    | Feuchtgebüsch / degenerierter Auwald / ehem. Fischeiche                           |   | Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Rastbiotop gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">444</a> | Östlich Laßrönne    | Grünlandgebiet  | Weißstorch  | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten und Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel                    |
| <a href="#">445</a> | Östlich Laßrönne    | Ehem. Beetgräben / Röhrichtvegetation   | Weißstorch  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">446</a> | Östlich Eggerslust  | Grün- und Ackerland   | Braunkehlchen, Gro-<br>ßer Brachvogel, Kie-<br>bitz   | Lebensraum gefährdeter Vogel- und Nachtfalterarten   | 2    | NLWKN Brutvögel, Fauna             |
| 446b                | Östlich Eggerslust  | Grün- und Ackerland   | Braunkehlchen, Gro-<br>ßer Brachvogel,<br>Kiebitz, Weißstorch   | Lebensraum gefährdeter Vogel- und Nachtfalter-<br>arten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel, Fauna             |
| <a href="#">447</a> | Südlich Drage       | Tümpel / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland-<br>brache / Gehölzbestände          |   | Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvögel / Lebens-<br>raum gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                        |
| <a href="#">448</a> | Südöstlich Drage    | Kleientnahmestelle / Bracks / Röhrichtvegetati-<br>on / Flachwasserbereiche       | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel, Seeadler,<br>Weißstorch | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Ver-<br>mehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Am-<br>phibien- und Libellenarten / Rastbiotop gefährdeter<br>Vogelarten / Nahrungshabitat des Seeadlers / Nah-<br>rungshabitat Weißstorch | 1    | NLWKN Fauna                        |

| ID                  | Lage                      | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle  |
|---------------------|---------------------------|--|---|--|------|---|
| <a href="#">449</a> | Südlich Drage             | Drennhäuser Hinterdeich / zahlreiche Bracks / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Trockenrasen / Gräben   | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel, Euphor-<br>bia palustris, Weiß-<br>storch | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkom-<br>men gefährdeter Vegetationsbestände / Standort<br>gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und<br>Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibien-<br>arten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten / Rast-<br>biotop gefährdeter Gastvögel / Nahrungshabitat<br>Weißstorch   | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Flora, Brut-<br>vögel, Fau-<br>na |
| <a href="#">450</a> | Südöstlich<br>Drage       | Großflächiges landwirtschaftlich genutztes<br>Acker- und Grünlandgebiet  | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel, Weiß-<br>storch                           | Nationale Bedeutung für Gastvögel / Nahrungshabi-<br>tat Weißstorch  | 1    | NLWKN<br>Gastvögel                                    |
| <a href="#">451</a> | Nördlich<br>Hunden        | Röhricht / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Gra-<br>ben / Gehölzbestände   | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs-<br>gebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibien-<br>arten / Rastbiotop gefährdeter Wasservogelarten  | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">452</a> | Nordöstlich<br>Tönnhausen | Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackerge-<br>biet  | Zwerg- und Höcker-<br>schwan, Graugans,<br>Kanadagans, Schnat-<br>terente, Spießente,<br>Löffelente, Reiherente,<br>Gänsesäger, Regen-<br>brachvogel, Weiß-<br>storch                           | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter<br>Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brut-<br>vögel (lokal) / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN<br>Gastvögel,<br>Brutvögel                      |
| <a href="#">453</a> | Nordwestlich<br>Eichholz  | Ehemalige Altarmrinne - Gräben / Röhrichtve-<br>getation / lokal Beetgräben  | Euphorbia palustris   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop<br>gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">454</a> | Südlich Drage             | Drennhäuser Hinterdeich / ausgedehntes, ex-<br>tensives Grünland / z.T. Feuchtgrünland / z.T.<br>trockenes Grünland / zahlreiche Bracks /<br>Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation /<br>Deich mit Trockenrasenvegetation | Eryngium cam-<br>pestre, Zwerg- und<br>Höckerschwan, Grau-<br>gans, Kanadagans,<br>Schnatterente, Spieß-<br>ente, Löffelente, Rei-<br>herente, Gänsesäger,                                      | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkom-<br>men gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegeta-<br>tionszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten /<br>Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Rastbio-<br>top gefährdeter Wasservogelarten / Vermehrungsge-<br>biet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten /<br>Lebensraum für Libellenarten / Nahrungshabitat | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Flora, Brut-<br>vögel, Fau-<br>na |

| ID                  | Lage                                    | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                                      |
|---------------------|---|--|--|--|------|---|
|                     |   |  | Regenbrachvogel, Weißstorch  | Weißstorch   |      |   |
| <a href="#">455</a> | Nordwestlich Eichholz                   | Winsener Elbmarsch / Grünlandgebiet  | Weißstorch   | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN<br>Gastvögel                          |
| 455b                | Nordwestlich Eichholz                   | Winsener Elbmarsch / vorwiegend Acker  |  | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten - Bedeutungsverlust durch großflächige Umwandlung Grünland in Acker  | 2    | NLWKN<br>Gastvögel                          |
| <a href="#">456</a> | Nordwestlich Eichholz                   | Winsener Elbmarsch   | Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückengewürger, Rohrweihe, Wachtel, Wiesenweihe, Weißstorch                     | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Gastvögel,<br>LRP 94 |
| <a href="#">457</a> | Südöstlich Drage                        | Drennhäuser Hinterdeich / Brack / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / brach gefallenes Grünland / Gebüsch | Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückengewürger, Rohrweihe, Wachtel, Wiesenweihe                                 | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten   | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">458</a> | Südöstlich Drage                        | Verlandeter See, Feuchtgebüsch   |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | Biotopkartierung 2009                       |
| <a href="#">459</a> | Westlich Stöckte                        | Grünlandgebiet / z.T. brach gefallenes Grünland / kleinflächig Gehölzbestände / Graben                                       | Weißstorch   | Brutbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">460</a> | Ilmenau-Luhe Niederung                  | Deich  | Eryngium campestre   | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora                              |
| <a href="#">461</a> | Ilmenau-Luhe-Niederung, nördlich Winsen | Flußwatt / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Weichholzauen-Fragmente / Graben / Teich             | Nachtigall, Schilfrohsänger, Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Rohrschwirl, Schilfrohsänger, Uferschnepfe, Weißstorch | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Brut- und Rastbiotop gefährdeter Wiesen- und Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | NLWKN<br>Fauna, LRP 94                      |
| 461b                | Ilmenau-Luhe-Niederung, nördlich Winsen | Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Abgrabungsgewässer / Graben / z.T. Acker (im Norden)   | Nachtigall, Schilfrohsänger, Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Rohrschwirl, Schilfrohsänger, Uferschnepfe, Weißstorch | Pufferzone zum anschließenden Röhrichtgebiet / Brut- und Rastbiotop gefährdeter Wiesen- und Wasservogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN,<br>LRP 94                            |
| <a href="#">462</a> | Südwestlich Eggerslust                  | Röhrichtvegetation / Graben / Feuchtgrünland   | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94,<br>Biotopkartierung 2009            |

| ID                  | Lage                          | Kurzbeschreibung  | Arten                                    | Bedeutung   | Wert | Quelle                                    |
|---------------------|-------------------------------|---|--|---|------|---|
| <a href="#">463</a> | Südöstlich<br>Laßrönne        | Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Röhricht / Graben / Gebüsch / Acker   | Weißstorch                               | Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                   |
| <a href="#">464</a> | Südlich<br>Eggerslust         | Fischteichanlage / Graben   |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">465</a> | Südwestlich<br>Eggerslust     | Winsener Elbmarsch / Grünland / Feuchtgrünland / Fischteiche  | Weißstorch                               | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Gastvögel                           |
| <a href="#">466</a> | Nordöstlich<br>Winsen         | Ilau-Schnedegraben  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna                       |
| <a href="#">467</a> | Westlich<br>Tönnhausen        | Grünland, z.T. Feuchtgrünland / Röhricht / Graben / Gebüsch / Acker   | Braunkehlchen, Weißstorch                | Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel                |
| <a href="#">468</a> | Nördlich<br>Tönnhausen        | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland  | Weißstorch                               | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel   | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel                |
| <a href="#">469</a> | Östlich<br>Tönnhausen         | Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / Röhrichtvegetation  | Weißstorch                               | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Wandergebiet gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94, NLWKN Gastvögel, Brutvögel, Fauna |
| <a href="#">470</a> | Südwestlich<br>von Nettelberg | Kleinere Bracks / Sumpflvegetation / Gehölzbestände   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 2    | FFH                                       |
| <a href="#">471</a> | Verladebahnhof<br>Nettelberg  | Verladebahnhof, Ruderalflächen  | Carex pseudobrizoides, Petasites spurius | Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora                               |
| <a href="#">472</a> | Westlich<br>Tönnhausen        | Nassgrünland / Graben   | Weißstorch, Eryngium campestre           | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Brutvögel, Flora                    |
| <a href="#">473</a> | Südlich<br>Tönnhausen         | Grünlandbrache / Röhrichtvegetation / Seggenried / Graben / Gehölzbestände  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter                                   | 1    | NLWKN Brutvögel, LRP 94                   |
| <a href="#">474</a> | Östlich<br>Tönnhausen         | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland  | Weißstorch                               | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Gastvögel                           |
| <a href="#">475</a> | Nordwestlich<br>Tönnhausen    | Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet  | Weißstorch                               | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Brutvögel (landesweit) / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Gastvögel, Brutvögel                |
| <a href="#">476</a> | Nördlich<br>Hunden            | Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Obstwiese / Deich mit Trockenrasenvegetation |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                                    |



| ID                  | Lage                                  | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle  |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|---|------|---|
| <a href="#">477</a> | Östlich<br>Tönhausen                  | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland                             | Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Zwergschwan, Regenbrachvogel, Gänsesäger, Weißstorch                      | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel   | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Gastvögel                  |
| <a href="#">478</a> | Elbmarsch,<br>Tönhausen               | Alte Ilau / begradigtes Fließgewässer  | Euphorbia palustris  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Flora                         |
| <a href="#">479</a> | Nordöstlich<br>Tönhausen              | Röhrichtvegetation / Teich   | Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">480</a> | Südwestlich<br>Hunden                 | Verlandender Altarm / Röhrichtvegetation / Tümpel                            | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">481</a> | Südöstlich<br>Tönhausen               | Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / Röhrichtvegetation               |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten                                  | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel,<br>Fauna           |
| <a href="#">482</a> | Nordöstlich<br>Hunden                 | Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Teich / Grünland / Gebüsch          | Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückwürger, Rohrweihe, Wachtel, Weißstorch                      | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch                         | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">483</a> | Nordöstlich<br>Hunden                 | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland                  | Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rotrückwürger, Rohrweihe, Wachtel, Weißstorch, Euphorbia palustris | Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel / in Gräben Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Gastvögel,<br>Flora, Fauna |
| <a href="#">484</a> | Nordwestlich<br>Oldershausen          | Degenerierter Erlen-Eschenwald / Teich / Röhrichtvegetation                  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten  | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">485</a> | Nordöstlich<br>Hunden                 | Degenerierter Erlenbruch / Röhrichtvegetation / Grünland / Graben            | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94  |
| <a href="#">486</a> | Nordöstlich<br>Hunden                 | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grün- und Ackerland                  | Weißstorch, Euphorbia palustris  | Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / in Gräben Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten  | 1    | NLWKN<br>Brutvögel,<br>Flora, Fauna               |
| <a href="#">487</a> | Luhenniederung,<br>westlich<br>Winsen | Ahrensbrack / Tümpel / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 2    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Biotope                       |

| ID                  | Lage                           | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                  |
|---------------------|--------------------------------|--|--|---|------|-------------------------|
| <a href="#">488</a> | Luheniederung, westlich Winsen | Tümpel / Röhrichtvegetation / Sumpfvvegetation / Feuchtgebüsch   |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / potentielles Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 2    | NLWKN Biotope           |
| <a href="#">489</a> | Winsen                         | Luhe / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer   |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">490</a> | Illmenau-Luhe Niederung        | Stöckter Deich   | Allium oleraceum   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora             |
| <a href="#">491</a> | Südlich Tönnhäusen             | Grünlandbrache / Feuchtgrünlandbrache / z.T. Röhricht / Gehölzbestände   |  | Vorkommen naturnaher Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter   | 1    | NLWKN Brutvögel, LRP 94 |
| <a href="#">492</a> | Östlich Winsen                 | Fischteichanlage, z.T. extensiv genutzt / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände / Feuchtgrünland   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten   | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">493</a> | Östlich Tönnhäusen             | 4 Bracks / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Gehölze und Feuchtwiesen  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">494</a> | Westlich Tönnhäusen            | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland / Nassgrünland  | Weißstorch   | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel         |
| <a href="#">495</a> | Südlich Tönnhäusen             | Röhrichtvegetation / Seggenried / Feuchtgebüsch  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | NLWKN Brutvögel, LRP 94 |
| <a href="#">496</a> | Südlich Fahrenholz             | Großflächiges, größtenteils intensiv genutztes Grünland / z.T. Feuchtgrünland / lokal Ackerumbruch   | Braunkelchen, Kiebitz, Wachtel, Nachtigall, Feldlerche/ Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | Kartierung Fahrenholz   |
| <a href="#">497</a> | Nördlich Sängenstedt           | Graben   |  | Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 2    | NLWKN Fauna             |
| <a href="#">498</a> | Westlich Fahrenholz            | Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / degenerierter Erlenbruchwald   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Lebensraum für Libellenarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">499</a> | Südlich Fahrenholz             | FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze" / Grünland / Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Tümpel / Graben | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | NLWKN Brutvögel, LRP 94 |
| <a href="#">500</a> | Südlich Fahrenholz             | Abgrabungsteich / Feuchtbrache   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                  |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung   | Arten                                       | Bedeutung   | Wert | Quelle                     |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|------|----------------------------|
| <a href="#">501</a> | Luhenederung, westlich Bahlburg   | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland  | Fischotter, Weißstorch                      | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94, FFH                |
| <a href="#">502</a> | Luhenederung, westlich Roydorf    | Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit hohem Grünlandanteil / Graben / Teich           |   | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                     |
| 502b                | Luhenederung, westlich Roydorf    | Grünland   | Weißstorch                                  | Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">503</a> | Südlich Borstel                   | Bodensaurer Birken-Eichenwald  | Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1993) | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten  | 2    | LRP 94                     |
| <a href="#">504</a> | Östlich Borstel                   | Bodensaurer Birken-Eichenwald  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">505</a> | Östlich Sangenstedt               | Degenerierter Erlenbruchwald im Übergang zum Birkenbruch / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">506</a> | Westlich Rottorf                  | Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten  | 2    | LRP 94                     |
| <a href="#">507</a> | Östlich Sottorf                   | Begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II  |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Wander- und Lebensraum gefährdeter Fischarten   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna        |
| <a href="#">508</a> | Luhenederung, westlich Luhdorf    | Seitenarm der Luhe   | Fischotter, Weißstorch                      | Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch   | 2    | Biotopkartierung 2009, FFH |
| <a href="#">509</a> | Luhenederung, südwestlich Luhdorf | Unterlauf des Aubaches / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Altarmreste / Gehölzbestände / Acker | Fischotter                                  | Mäßig belastetes, z.T. naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 2    | LRP 94, FFH                |
| <a href="#">510</a> | Luhenederung, südlich Luhdorf     | Luhe-Kanal / stellenweise Schwimmblattvegetation / stellenweise Röhricht   | Fischotter                                  | Potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94, FFH                |
| <a href="#">511</a> | Luhenederung, nördlich Bahlburg   | Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Ufergehölze  | Fischotter                                  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna        |
| <a href="#">512</a> | Luhenederung nördlich Bahlburg    | Grünland / Feuchtgrünland / Nasswiese  |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | Biotopkartierung 2009      |

| ID                  | Lage                         | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                         |
|---------------------|------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|
| <a href="#">513</a> | Südlich Sangerstedt          | NSG Rethmoorsee / durch Sandentnahme entstandener See / nährstoffarme Flach- und Tiefwasserzonen / Röhricht-, Binsen- und Seggenriede / offene Sand- und Kiesflächen / naturnaher Bachverlauf / kleinere naturnahe Seen |   | Lebensraum für zahlreiche Amphibien-, Vogel- und Libellenarten / Rastplatz für Gastvögel / Wuchsort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | Biotopkartierung 2009          |
| <a href="#">514</a> | Südöstlich Luhdorf           | Hausbach / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald   |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten  | 1    | LRP 94                         |
| 514b                | Südöstlich Luhdorf           | Hausbach / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Acker / Nadel-Laubmischwald   | Großer Schillerfalter (Apatura iris), Schwarzstorch   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten und gefährdete Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna |
| <a href="#">515</a> | Luheneriederung bei Bahlburg | Begradigter Aubach / Güteklasse II / Grünland / Gehölzbestände / Acker  | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94, FFH                    |
| <a href="#">516</a> | Südöstlich Luhdorf           | Feuchtgebüsch   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten  | 2    | LRP 94                         |
| <a href="#">517</a> | Südöstlich Luhdorf           | Durch kleine Waldstücke und Gehölzstreifen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / Nadelforst / mesophiles Grünland / Acker / Teich / Graben                               |   | Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                         |
| 517b                | Südöstlich Luhdorf           | Grünland / Feuchtgrünland / Bachlauf  | Großer Schillerfalter (Apatura iris) und Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino) (1987), Schwarzstorch             | Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Schwarzstorches / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch                              | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel        |
| 517c                | Südöstlich Luhdorf           | Durch kleine Waldstücke und Gehölzstreifen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / Nadelforst / mesophiles Grünland / Acker / Teich / Graben                               | Weißstorch  | Gut strukturierte (z.T. naturnahe) Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94                         |
| 517d                | Südöstlich Luhdorf           | Grünland / Feuchtgrünland / Bachlauf  | Großer Schillerfalter (Apatura iris) und Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino) (1987), Schwarzstorch, Weißstorch | Gut strukturiertes, z.T. naturnahe Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten und des Schwarzstorches / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel        |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle                         |
|---------------------|--------------------------|--|---|--|------|--------------------------------|
| <a href="#">518</a> | Östlich Bahlbürg         | Von Nadelforst umgebenes Grünlandgebiet / bodensaure Eichen-Mischwald  |   | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94, NLWKN Biotope          |
| <a href="#">519</a> | Nordwestlich Eichholz    | Abgrabungsgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel / Pappelforst   | Euphorbia palustris, Weißstorch   | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten / Rastbiotop gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Gräben Bedeutung als Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch                  | 1    | LRP 94, NLWKN Flora, Fauna     |
| <a href="#">520</a> | Westlich Eichholz        | Im Rahmen der Flurbereinigung hergerichtetes Ausgleichsbiotop / Teich / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland mit Gräben / Gehölzbestände              |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten  | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">521</a> | Winsen                   | Luhe / begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II   |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 1    |                                |
| <a href="#">522</a> | Nördlich Winsen          | Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten / Vorkommen gefährdeter Libellenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna            |
| <a href="#">523</a> | Südlich Niedermarschacht | Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Feuchtgrünland / Bruchwald / Acker  | Euphorbia palustris, Braunkehlchen, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Brutvögel / in Gräben Standort gefährdeter Pflanzenarten und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel, Flora, Fauna  |
| <a href="#">524</a> | Südlich Niedermarschacht | Großflächiges landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker   | Euphorbia palustris, Braunkehlchen, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Brutvögel / in Gräben Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel, Flora         |
| <a href="#">525</a> | Nordöstlich Eichholz     | Röhrichtvegetation / Gehölzbestände  | Weißstorch  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel        |
| <a href="#">526</a> | Nordöstlich Eichholz     | Graben   | Euphorbia palustris   | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora                    |
| <a href="#">527</a> | Östlich Eichholz         | Stilkensdeich / degenerierter Erlenbruch / Feuchtgrünlandbrache / trockenes Grünland / eutropher Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation | Weißstorch, Euphorbia palustris   | Historischer Deich / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten (Graben) / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel, Flora |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung  | Arten                                    | Bedeutung   | Wert | Quelle                             |
|---------------------|-----------------------|---|--|---|------|------------------------------------|
| <a href="#">528</a> | Östlich Eichholz      | Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Nasswiese / extensive Weide                              | Weißstorch                               | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Rast- und Nahrungsbiotop für zahlreiche Wasservögel / Gänse / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel            |
| <a href="#">529</a> | Westlich Tespe        | Röhrichtvegetation / Sumpf / Grünland / Feuchtgebüsch / Gehölzreihen / Birken-Eichenwald / Tümpel | Zwergbläuling (Cupido minimus) (1989)    | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für zahlreiche, z.T. gefährdete Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">530</a> | Südlich Tespe         | Erlen-Birken-Eichenwald / Grünland / Teich  | Zwergbläuling (Cupido minimus) (1989)    | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Schmetterlingsarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">531</a> | Tespe                 | Erlen-(bruch)wald / Feuchtgebüsch / Teiche  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">532</a> | Nördlich Tespe        | Elbvordeichsfläche / Grünland / Ufergehölze   | Weißstorch                               | Rastbiotop für Wasservogelarten / Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Gastvögel            |
| <a href="#">533</a> | Nordöstlich Tespe     | Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Tümpel   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">534</a> | Östlich Tespe         | Reich strukturiertes Grünlandgebiet / Teiche  | Weißstorch, 'Braunkehlchen, Wachtelkönig | Lebensraum gefährdeter Brutvögel / Nahrungshabitat Weißstorch / Vorkommen gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Brutvögel, Fauna             |
| <a href="#">535</a> | Südwestlich Eichholz  | Polder mit Röhrichtvegetation / lokal Gehölzbestände  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">536</a> | Südlich Eichholz      | Winsener Elbmarsch / Tümpel   | Moorfrosch, Weißstorch                   | Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Fauna                        |
| <a href="#">537</a> | Nördlich Obershausen  | Winsener Elbmarsch / Grünland- und Ackergebiet  | Weißstorch                               | Wander- und Rastgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Brutgebiet zahlreicher gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Gastvögel, Brutvögel         |
| <a href="#">538</a> | Südlich Eichholz      | Ehemalige Abgrabungsfläche / Feuchtgrünlandbrache / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände           | Weißstorch                               | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Gastvögel, Brutvögel |
| <a href="#">539</a> | Nördlich Oldershausen | Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Gehölzstreifen |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Wasservögel / Vermehrungsgebiet für Amphibien                            | 1    | NLWKN Brutvögel                    |
| <a href="#">540</a> | Nördlich Oldershausen | Grünlandgebiet / Feuchtgrünland   | Weißstorch                               | Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel   | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel         |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                                       |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|------|--|
| <a href="#">541</a> | Nördlich Oldershausen    | Grünlandgebiet / Feuchtgrünland  | Weißstorch   | Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs / Rastgebiet für Wiesen- und Wasservögel   | 1    | NLWKN Brutvögel, Gastvögel                   |
| <a href="#">542</a> | Südöstlich Eichholz      | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker   | Braunkelchen, Großer Brachvogel, Kiebitz, Weißstorch                     | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                              |
| <a href="#">543</a> | Südöstlich Eichholz      | Großflächiges, meist intensiv genutztes Grünland   | Weißstorch   | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                              |
| <a href="#">544</a> | Nördlich Oldershausen    | Feuchtgrünland / Röhrichtvegetation / Kleingewässer / Feuchtgebüsch  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch                                    | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                      |
| <a href="#">545</a> | Nordöstlich Oldershausen | Ehemaliger Altarm / Röhrichtvegetation / Erlbruchwald / Tümpel   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter und Libellenarten  | 1    | LRP 94                                       |
| <a href="#">546</a> | Östlich Oldershausen     | Meist intensiv genutztes Grünland / kleinräumig Röhrichtbestände / Tümpel  | Weißstorch   | Nahrungsgebiet für gefährdete Vogelarten, u.a. des Weißstorchs  | 1    | NLWKN Brutvögel, Fauna                       |
| <a href="#">547</a> | Östlich Fahrenholz       | Alte Neetze / begradigtes, z.T. eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Grünlandvegetation                        | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotters | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna               |
| <a href="#">548</a> | Südöstlich Eichholz      | Ordersee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                                       |
| <a href="#">549</a> | Westlich Bütlingen       | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker   | Weißstorch   | Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                              |
| <a href="#">550</a> | Westlich Bütlingen       | Alte Ilau / z.T. naturnahes Fließgewässer / lokal Schwimmblattvegetation / lokal Röhrichtvegetation / randlich überwiegend Acker |  | Z.T. naturnahes Fließgewässer / in übrigen Bereichen Möglichkeit zur naturnahen Gestaltung / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                       |
| <a href="#">551</a> | Westlich Bütlingen       | Bodensaurer Kiefern-Birken-Eichenwald / Teich  | Rotmilan   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Greifvögel   | 1    | Biotopkartierung 2009, Vogelkartierung K LKH |
| <a href="#">552</a> | Westlich Bütlingen       | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker   | Braunkelchen, Kiebitz, Nachtigall, Rotrückenwürger, Wachstel, Weißstorch | Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                              |
| <a href="#">553</a> | Nördlich Bütlingen       | Durch Landzungen und Inseln gegliederter Bodenernteteich   |  | Lebensraum gefährdeter Amphibien / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten  | 1    | Biotopkartierung 2009                        |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                   |
|---------------------|---------------------------------|---|--|---|------|--------------------------|
| <a href="#">554</a> | Nordöstlich Winsen              | Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten  | 2    | LRP 94                   |
| 554b                | Nordöstlich Winsen              | Ilau-Schnedegraben / Güteklasse II - III  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum für Fisch- und Wasservogelarten  | 1    | LRP 94                   |
| <a href="#">555</a> | Westlich Bütlingen              | Alte Ilau / weitgehend begradigtes Fließgewässer / z.T. Schwimmblattvegetation  |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                   |
| <a href="#">556</a> | Bütlingen                       | Ruderalflur   | Westliche Beißschrecke ( <i>Platycleis albopunctata</i> ), (1989)    | Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten   | 2    | NLWKN Fauna              |
| <a href="#">557</a> | Östlich Bütlingen               | Trockene Grünlandbrache / stellenweise Sandmagerrasen / Grünlandbrache / Eichenmischwald                                      |  | Vorkommen gefährdeter Pflanzengesellschaften / Lebensraum zahlreicher, z.T. gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94                   |
| <a href="#">558</a> | Östlich Avendorf                | Teich / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Nadel-Laubmischwald / Sandtrockenrasen   |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Röhrichtbrüter / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Gastvögel  |
| <a href="#">559</a> | Östlich Tespe, südlich Avendorf | Durch Gehölzreihen und Wäldchen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen / Graben / Teich | Maulwurfgrille ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) (1986)             | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken   | 2    | LRP 94                   |
| 559b                | Östlich Tespe, südlich Avendorf | Durch Gehölzreihen und Wäldchen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit Grünlandanteilen / Graben / Teich | Maulwurfgrille ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) (1986), Weißstorch | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brut- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                   |
| <a href="#">560</a> | Oldershausen                    | Neetze, im Ortsgebiet von Oldershausen Ufergehölze / randlich Grünlandvegetation  | Weißstorch, Fischotter   | Teilweise FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Nahrungshabitat Weißstorch / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotters | 1    | LRP 94, FFH, NLWKN Fauna |
| <a href="#">561</a> | Südwestlich Oldershausen        | Röhrichtvegetation / Brack  | Weißstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                   |
| <a href="#">562</a> | Südwestlich Oldershausen        | Röhrichtvegetation  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Brutbiotop für Röhrichtbrüter   | 1    | Biotopkartierung 2009    |
| <a href="#">563</a> | Südwestlich Oldershausen        | Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / degenerierter Erlenbruch                                |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten   | 1    | LRP 94                   |



| ID                  | Lage                        | Kurzbeschreibung  | Arten                     | Bedeutung  | Wert | Quelle                                      |
|---------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--|------|---|
| <a href="#">564</a> | Südwestlich<br>Oldershausen | Röhrichtvegetation  | Weißstorch                | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Vermehrungsbiotop und Lebensraum für Amphibienarten / Brutbiotop für Röhrichtbrüter / Nahrungshabitat Weißstorch | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">565</a> | Nordöstlich<br>Winsen       | Ilmenaukanal / begradigtes, eingedeichtes Fließgewässer   | Fischotter                | FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Wandergebiet für gefährdete Fischarten / potentieller Lebens- und Wanderraum des Fischotter         | 2    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna                   |
| <a href="#">566</a> | Nordöstlich<br>Rottorf      | Begradigtes und eingedeichtes Fließgewässer   |                           | FFH-Gebiet "Gewässersystem der Luhe und Unteren Neetze": Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Wander- und Lebensraum gefährdeter Fischarten         | 2    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna                   |
| <a href="#">567</a> | Östlich<br>Oldershausen     | Erlenbruchwald / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch   |                           | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">568</a> | Östlich<br>Fahrenholz       | Alte Neetze / begradigtes, z.T. eingedeichtes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Grünlandvegetation |                           | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten                                | 2    | LRP 94                                      |
| <a href="#">569</a> | Östlich<br>Bütlingen        | Erlen-Eschenwald / angrenzend Grünland  |                           | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">570</a> | Östlich<br>Bütlingen        | Hölken- und Burensee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Erlenbruch-Fragmente                 |                           | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten         | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">571</a> | Südlich<br>Bütlingen        | Landwirtschaftlich genutztes Gebiet / Grünland / Acker  | Weißstorch                | Nahrungshabitat Weißstorch   | 1    | NLWKN<br>Brutvögel                          |
| <a href="#">572</a> | Südöstlich<br>Bütlingen     | Metzensee / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Erlen-Eschenwald                |                           | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Libellenarten           | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">573</a> | Nordwestlich<br>Vaerloh     | Eutropher Teich im Grünland / Sumpfvegetation / Röhrichtvegetation  |                           | Lebensraum gefährdeter Wasservogelarten / Lebensraum für Libellenarten   | 1    | LRP 94                                      |
| <a href="#">574</a> | Westlich<br>Vaerloh         | Großflächiges Grünlandgebiet  |                           | Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten und Gastvögel   | 2    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel,<br>Gastvögel |
| <a href="#">575</a> | Nordöstlich<br>Vaerloh      | Grünlandgebiet aus meist mesophilem, teils intensiv genutztem Grünland / geringe Gehölzbestände / Gräben  | Kornweihe, Schwarzstorch  | Nahrungsbiotop für gefährdete Wasservogelarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Schwarzstorch Nahrungshabitat / Lebensraum für Gastvögel            | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel               |
| <a href="#">576</a> | Nördlich<br>Vaerloh         | Begradigter Bachlauf der Aue / Güteklasse II / Grünland / z.T. Ufergehölze                                | Fischotter, Schwarzstorch | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel                               | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel               |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung   | Arten                                    | Bedeutung   | Wert | Quelle   |
|---------------------|----------------------|--|--|---|------|--|
| <a href="#">577</a> | Nordöstlich Vaerloh  | Junger Birkenwald, z.T. Birkenbruchwald / z.T. hohe Kiefernbeimischung / Pfeifengras-Degenerationsstadium  | Schwarzstorch                            | Naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Schwarzstorch Nahrungshabitat / Lebensraum für Gastvögel  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">578</a> | Südlich Heidenau     | Grünland / Acker   | Kornweihe                                | Nahrungshabitat Kornweihe   | 1    | NLWKN Brutvögel                                |
| <a href="#">579</a> | Südwestlich Heidenau | Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Gebüsch / Graben  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Reptilienarten  | 1    | NLWKN Flora                                    |
| <a href="#">580</a> | Westlich Vaerloh     | Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Gräben / Gehölze  | Schwarzstorch                            | Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel   | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                        |
| 580b                | Westlich Vaerloh     | Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / Gräben / Gehölze  |  | Lebensraum für gefährdete Wiesenvogelarten  | 2    | LRP 94   |
| <a href="#">581</a> | Nordwestlich Vaerloh | Durch zahlreiche Wälder und Gehölzreihen gegliederte Grünlandbereiche / Grünland / Eichen-Birken-Kiefernwald / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Gräben   | Schwarzstorch                            | Naturnahe Lebensräume / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum für Gastvögel  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel                        |
| <a href="#">582</a> | Südlich Heidenau     | Grünland   | Waldwasserläufer, Kranich, Schwarzstorch | Nahrungshabitat Schwarzstorch, Lebensraum für Gastvögel, Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | NLWKN Brutvögel                                |
| <a href="#">583</a> | Östlich Vaerloh      | Verlandendes Schlatt / Torfmoos-Schwingrasen / oligotrophes Stillgewässer / nährstoffarmer Seggensumpf   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94   |
| <a href="#">584</a> | Nordwestlich Wistedt | Großes Moor bei Wistedt (Randbereich) / Erlenbruch / Birkenbruch / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Grünland / Moorheide / Feuchtgebüsch / Tümpel        | Kranich, Wasserläufer                    | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009                  |
| <a href="#">585</a> | Nordwestlich Wistedt | Großes Moor bei Wistedt (Kernbereich) / wassergefüllte und verlandende Torfstiche / Torfmoos-Schwingrasen / Hochmoorvegetation / Moorheide / Feuchtgebüsch | Kranich, Wasserläufer                    | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungs- und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten | 1    | LRP 94   |

| ID                  | Lage                | Kurzbeschreibung   | Arten                                       | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------|--|---|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">586</a> | Westlich Wistedt    | Feuchter Eichen-Birkenwald mit Übergängen zum Birken- und Erlenbruchwald / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / neu angelegter Naturtümpel   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">587</a> | Westlich Wistedt    | Überwiegend durch Grünland, z.T. durch Acker fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / bis auf wenige Ausnahmen im Westen keine Ufergehölze   | Fischotter                                  | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">588</a> | Südlich Avensermoor | Durch zahlreiche Kleinwälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünlandgebiet / Birkenwälder auf abgetrocknetem Moorboden, stellenweise Übergang zum feuchten bis frischen Birken-Eichenwald / Torfstiche, z.T. verlandend / Sumpf / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / z.T. Acker  | Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1980) | Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien-, Libellen- und Schmetterlingsarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">589</a> | Nördlich Wümme      | Torfstichgebiet / Stillgewässer / Röhricht / Torfmoosrasen / Feuchtgebüsch / Fischteiche   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">590</a> | Südwestlich Wistedt | Von degeneriertem Birkenbruch und Feuchtgrünland umgebenes Feuchtgebüsch / nährstoffarmes Seggenried   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">591</a> | Südwestlich Wistedt | Feuchter Birken-Eichenwald / Nadel-Laubmischwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Grün- und Ackerland / Moor- und Sumpfgbüsch / Tümpel  |   | Vorkommen naturnaher Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">592</a> | Südwestlich Wistedt | Durch schwach besiedeltes Gebiet fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / Gärten / Grünland / Wald   | Fischotter                                  | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">593</a> | Nördlich Wümme      | Nasswiese / Anmoorheide / Feuchtgebüsch  |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">594</a> | Südlich Avensermoor | Durch zahlreiche Kleinwälder und Gehölzbestände gegliedertes Grünlandgebiet / Birkenwälder auf abgetrocknetem Moorboden / stellenweise Übergang zum feuchten bis frischen Birken-Eichenwald / Torfstiche, z.T. verlandend / Sumpf / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Tümpel / z.T. Acker | Kiebitz, Schwarzstorch                      | Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">595</a> | Südlich Wümme       | Wümmeniederung / Nass- und Feuchtwiesen / Grünland / Acker / Birken- und Kiefern-Bruchwald   |   | Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten / Puffergebiet zu hochwertigem FFH-Gebiet "Obere Wümmeniederung" / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume                  | 2    | NLWKN Brutvögel               |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung   | Arten                  | Bedeutung  | Wert | Quelle                             |
|---------------------|-----------------------|--|------------------------|--|------|------------------------------------|
| <a href="#">596</a> | Südlich Wümme         | Teils begradigter, teils naturnaher Verlauf der Wümme / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Ufergehölze  | Fischotter             | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                |
| <a href="#">597</a> | Südlich Avensermoor   | Grünland   | Kiebitz, Schwarzstorch | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                    |
| <a href="#">598</a> | Südlich Dreihausen    | Extensiv genutzter Abschnitt der Wümmeniederung / Erlenbruch / Birkenbruch / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenrieder / Kleinmoore / Moorheide / oligotrophe Stillgewässer / eutrophe Stillgewässer / Feuchtgebüsch / Dünenzüge mit Nadel-Laubmischwald |                        | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten | 1    | LRP 94, FFH, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">599</a> | Nördlich Königsmoor   | Wümmeniederung, durch Grünland geprägt / z.T. Feuchtgrünland / Binnendüne / Gehölze / Teiche   |                        | NSG: Pufferzone für wertvolle Kernbereiche   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">600</a> | Königsmoor            | Überwiegend grünlandgenutztes, durch zahlreiche Gehölzreihen gegliedertes Gebiet / z.T. Acker / Streusiedlungen  |                        | Gut strukturierter, z.T. naturnaher Lebensraum / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">601</a> | Südöstlich Königsmoor | Birkenwald auf abgetrocknetem Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Feuchtgebüsch  |                        | Standort gefährdeter Pflanzenarten / naturnahe Lebensräume   | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">602</a> | Nordwestlich Wistedt  | Großflächiges Grünlandgebiet, z.T. extensiv genutzt / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / Tümpel / Gräben / Gehölzreihen  | Kornweihe, Rotmilan    | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Wiesenvogelarten und Greifvögel / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94, VK LKH, NLWKN Brutvögel    |
| <a href="#">603</a> | Südlich Dohren        | Mühlenbachtal, Oberlauf / durch Grünland fließender, begradigter Bachlauf / Güteklasse III / Gehölzbestände  |                        | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Wanderraum für Amphibien  | 2    | LRP 94                             |
| <a href="#">604</a> | Östlich Dohren        | Abbaugewässer  |                        | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                        |
| <a href="#">605</a> | Nördlich Todtglüsing  | Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / randlich Acker / Nadelwaldaufforstung   |                        | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna                        |
| <a href="#">606</a> | Nördlich Todtglüsing  | Ehemalige Abgrabung / temporäre Tümpel / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Trockenrasenvegetation   |                        | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten   | 1    | LRP 94                             |
| <a href="#">607</a> | Südwestlich Sprötze   | Durch Dünen und Mulden stark reliefiertes Gelände / Feuchtgrünland / oligotrophe Sumpflvegetation / Borstgrasrasen-Fragmente / Sandabgrabung   |                        | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum von Amphibien- und Reptilienarten   | 1    | LRP 94                             |

| ID                  | Lage                          | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle |
|---------------------|-------------------------------|---|---|---|------|--------|
| <a href="#">608</a> | Nordöstlich<br>Todtglüsingern | Todtschlatt / Quellmoorvegetation / Heide /<br>nährstoffarmer Sumpf / Birkenbruch / Feucht-<br>gebüsch  |   | Gefährdete Vegetationsbestände / Standort gefähr-<br>deter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienar-<br>ten / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">609</a> | Südwestlich<br>Sprötze        | Grünlandgebiet mit Gehölzbeständen / Teich  |   | Pufferbereich für wertvolle Ökosystemtypen  | 2    | LRP 94 |
| <a href="#">610</a> | Östlich<br>Todtglüsingern     | Talraum eines linken Seitenbaches der Este /<br>Güteklasse II - III / überwiegend begradigter<br>Bachlauf / Feuchtgrünland / Feuchtgrünland-<br>brache / Sumpf / verlandete Torfstiche / Birken-<br>Erlenbruchwald / Teiche |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für<br>Amphibienarten / Lebensraum für Heuschreckenar-<br>ten                                      | 2    | LRP 94 |
| <a href="#">611</a> | Östlich<br>Todtglüsingern     | Talraum eines linken Seitenbaches der Este,<br>Oberlauf / Güteklasse III / Fischteiche / Feucht-<br>grünlandbrache / Feuchtgebüsch / Erlen-<br>Pappelwald   |   | Z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Am-<br>phibienarten / Lebensraum für Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94 |
| <a href="#">612</a> | Südwestlich<br>Sprötze        | Oligotropher Tümpel in einem Kiefernforst /<br>nährstoffarme Sumpfvegetation  |   | Vorkommen gefährdeter Biotope / Lebensraum zahl-<br>reicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum<br>für Amphibienarten  | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">613</a> | Südwestlich<br>Sprötze        | Trelder Moorkoppel / Hochmoorvegetation /<br>Moorheide / Feuchtgrünlandbrache / oli-<br>gotrophe Teiche / Torfstiche / Birkenbruch /<br>Gräben  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für<br>Amphibien- und Reptilienarten   | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">614</a> | Südöstlich<br>Sprötze         | Brunsborg / Sandheide / offene Sandflächen  |   | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestän-<br>de / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebens-<br>raum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Haut-<br>flügler                               | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">615</a> | Südlich<br>Sprötze            | Heidevegetation / offene Sandflächen  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände /<br>Lebensraum wärmeliebender Hautflügler  | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">616</a> | Südwestlich<br>Tostedt        | Düvelshöpen / Eichen-Hainbuchenwald mit<br>Übergängen zum mesophilen Buchenwald und<br>zum Erlen-Eschenwald / im Westen Feucht-<br>grünland, z.T. Feuchtgrünlandbrache  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">617</a> | Südöstlich<br>Tostedt         | 2 durch einen Grünlandstreifen getrennte Ei-<br>chen-Hainbuchenwälder   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">618</a> | Südwestlich<br>Langeloh       | Eichen-Hainbuchenwald, teils naturnah, teils<br>forstlich intensiv gepflegt / kleiner Bach / Teich /<br>Schwimblattvegetation   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften /<br>Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungs-<br>gebiet für Amphibien / Lebensraum zahlreicher und<br>gefährdeter Libellenarten                 | 1    | LRP 94 |
| <a href="#">619</a> | Südlich<br>Kakenstorf         | Estetal mit überwiegend begradigtem Verlauf<br>der Este / Güteklasse II / überwiegend Grün-<br>land, nur z.T. Feuchtgrünland oder Feuchtgrün-<br>landbrachen / kleinflächig Erlenbruchwald /<br>Ufergehölz / Teiche         | Feuchtwiesen-<br>Perlmutterfalter (Brenthis<br>ino), (1987), Fischot-<br>ter, Schwarzstorch | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährde-<br>ter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-<br>Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch /<br>Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten | 1    | LRP 94 |

| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle              |
|---------------------|-------------------------|---|---|--|------|---------------------|
| <a href="#">620</a> | Östlich Langeloh        | Mesotrophes Stillgewässer in einer Abgrabung, umgeben von Kiefernauflistung   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum von Libellen   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">621</a> | Südlich Langeloh        | Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Birkenbruchwald / Seggenried / Sumpf / Feuchtgebüsch  | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / vermutlich Lebensraum gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">622</a> | Südlich Langeloh        | Gehölzbestand   | Schwarzstorch   | Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel     |
| <a href="#">623</a> | Westlich Holm-Seppensen | Kleiner Quellmoor-Bereich im Nadelforst   |   | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">624</a> | Westlich Wörme          | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Traubeneichenkratt  |   | Vorkommen seltener Waldgesellschaften / kulturhistorische Waldnutzungsform / Standort gefährdeter Flechten   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">625</a> | Südlich Wistedt         | Kauers Wittmoor, nördlicher Bereich / Moorheide und Hochmoorvegetation / offene Wasserstellen / Sandheide / Gehölzbewuchs / Sandentnahmestelle im Norden mit Pioniervegetation nasser Standorte und Teichen / Gehölzbewuchs | Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon), Dactylorhiza spagnicola | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten                | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">626</a> | Südlich Wistedt         | Kauers Wittmoor, mittlerer Bereich / Grünland, z.T. Feuchtgrünland  |   | NSG: Pufferzone für die wertvollen Teilflächen / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">627</a> | Südlich Wistedt         | Kauers Wittmoor, südlicher Bereich / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Tümpel / Gräben  |   | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">628</a> | Südlich Wistedt         | Überwiegend durch Grünland, z.T. Acker fließende, begradigte Oste / Güteklasse II / kaum Ufergehölze  | Fischotter, Schwarzstorch                                       | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">629</a> | Nordwestlich Dreihausen | Torfstichgebiet / verlandende Torfstiche / offene Wasserstellen / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch  |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet für Amphibienarten   | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">630</a> | Südwestlich Quellen     | Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlenbruch  | Bekassine   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94, AKN         |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung  | Arten                                    | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------------------|---|--|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">631</a> | Südwestlich<br>Tostedt          | Gut strukturierter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / z. T. Acker / Feuchtgebüsch / Erlen- und Birkenbruchwälder, mehr oder weniger stark degeneriert / feuchter Eichen-Birkenwald / Nadel-Laubmischwald / Tümpel und Teiche, z.T. Fischteiche / zahlreiche kleine Fließgewässer / Entwässerungsgräben |  | Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten                                 | 2    | LRP 94                        |
| 631b                | Südwestlich<br>Tostedt          | Gut strukturierter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / z. T. Acker / Feuchtgebüsch / Erlen- und Birkenbruchwälder, mehr oder weniger stark degeneriert / feuchter Eichen-Birkenwald / Nadel-Laubmischwald / Tümpel und Teiche, z.T. Fischteiche / zahlreiche kleine Fließgewässer / Entwässerungsgräben | Schwarzstorch,,<br>Gentiana pneumonanthe | Naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch | 1    | NLWKN<br>Flora, LRP<br>94     |
| <a href="#">632</a> | Nordöstlich<br>Schillingsbostel | Eichen-Hainbuchenwald mit Übergängen zum Erlenbruch / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel  | Schwarzstorch, Eisvogel                  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum von Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">633</a> | Nördlich<br>Kamperlien          | Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut gegliederter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Tümpel / Tongruben mit Teichen / randlich gut ausgebildete mesophile Wälder   |  | Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Reptilien  | 2    | LRP 94                        |
| 633b                | Nördlich<br>Kamperlien          | Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut gegliederter Grünlandbereich / z.T. Feuchtgrünland / Tümpel / Tongruben mit Teichen / randlich gut ausgebildete mesophile Wälder   | Schwarzstorch                            | Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Reptilien / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel |
| <a href="#">634</a> | Westlich<br>Höckel              | Niederung beiderseits der Este / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Gehölzbestände / Entwässerungsgräben / Teiche   |  | Pufferzone für wertvolle Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 2    | LRP 94                        |
| 634b                | Westlich<br>Höckel              | Niederung beiderseits der Este / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Gehölzbestände / Entwässerungsgräben / Teiche   | Schwarzstorch                            | Pufferzone für wertvolle Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch                           | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Brutvögel |

| ID                  | Lage                        | Kurzbeschreibung   | Arten                           | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">635</a> | Östlich<br>Hoinkenbostel    | Mesotrophes, flaches Stillgewässer / Röhricht / Feuchtgebüsch / Totholz  |                                 | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten     | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">636</a> | Südöstlich<br>Hoinkenbostel | In der Esteniederung gelegenes Feuchtgebiet / Röhricht / Seggenried / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Gehölze  | Kranich                         | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten    | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">637</a> | Westlich<br>Höckel          | Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland / z.T. Feuchtgrünland oder Feuchtbrache / Teichanlage / wenige Ufergehölze   | Fischotter, Schwarzstorch       | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch                          | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">638</a> | Südöstlich<br>Hoinkenbostel | Von Birkenbruch umgebenes Quellmoor (degeneriert)  |                                 | Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten              | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">639</a> | Nordöstlich<br>Höckel       | Heidevegetation  |                                 | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände  | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">640</a> | Nordwestlich<br>Handeloh    | Kleinräumig traditionelle Heckenstrukturen, magere Ackerbrache   | Zauneidechse                    | Lebensraum geschützter Amphibien- und Reptilienarten   | 2    | AKN                           |
| <a href="#">641</a> | Nördlich<br>Dreihausen      | Hochmoorvegetation / Moorheide / Feuchtgebüsch / verlandende Torfstiche / Abgrabungsteich  |                                 | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">642</a> | Südlich<br>Dreihausen       | Teils naturnaher, teils begradigter Verlauf der Wümme / Güteklasse II / der umgebende Niederungsbereich weist überwiegend naturnahe Vegetationsstrukturen auf / Erlenbruch / Feuchtgrünlandbrache / Grünland | Fischotter, Brenthis ino (1987) | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten     | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">643</a> | Nordöstlich<br>Dreihausen   | Pfeifengras-Degenerationsstadium / Feuchtgebüsch   |                                 | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">644</a> | Südlich<br>Riepshof         | Nassgrünland / Grünland / Birken-Kiefernwald / kleine Tümpel / Grünlandbrache  | Grasfrosch                      | Pufferbereich zu hochwertigem FFH-Gebiet / kleine Tümpel / Laichgewässer gefährdeter Amphibienarten  | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">645</a> | Westlich<br>Otter           | Von Kiefernforst umgebene Trockenbrache / stellenweise Gehölzaufwuchs  |                                 | Lebensraum für zahlreiche Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">646</a> | Westlich<br>Otter           | Birken-Eichenwald, z.T. mit Kiefernbeimischung   |                                 | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">647</a> | Westlich<br>Kampen          | Feuchter Birken-Eichenwald mit Übergängen zum Erlenbruch- und Eichen-Hainbuchenwald / Tümpel   |                                 | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">648</a> | Östlich<br>Otter            | Bodensaurer Birken-Eichenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald   |                                 | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Brutbiotop gefährdeter Greifvogelarten  | 1    | LRP 94                        |



| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung   | Arten      | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|----------------------|--|------------|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">649</a> | Südöstlich Otter     | Mehrere Kiefernforste  |            | Zeitweilig Brutbiotop gefährdeter Greifvogelarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">650</a> | Welle                | Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Güteklasse II / überwiegend Grünland, z.T. Feuchtgrünland   | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">651</a> | Westlich Welle       | Fuhlaubachniederung / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Erlenbruch-Fragmente / Gehölze / Entwässerungsgräben  |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">652</a> | Westlich Welle       | Feuchtgrünlandbrache / Sumpf / Feuchtgebüsch   |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">653</a> | Östlich Welle        | Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände   |            | Brutbiotop gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">654</a> | Südlich Handeloh     | Quellgebiet / Feuchtgrünlandbrache   |            | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">655</a> | Südwestlich Handeloh | Sandheide / Gehölzaufwuchs   |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">656</a> | Südöstlich Welle     | Grünland / Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragmente   |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">657</a> | Südöstlich Welle     | Grünland / Feuchtgrünland / z.T. Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragmente   |            | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">658</a> | Südlich Handeloh     | Sandheide / Gehölzbestände   |            | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum wärmeliebender Tierarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">659</a> | Südwestlich Otter    | Wümmeniederung, durch Grünland geprägt / z.T. Feuchtgrünland und -brache / degenerierter Erlenbruch  |            | NSG: Pufferzone für wertvolle Kernbereiche   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">660</a> | Südwestlich Otter    | Extensiv genutzter Abschnitt der Wümmeniederung / Erlenbruch / Birkenbruch / Erlen-Eschenwald / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadien / Teich / Graben |            | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">661</a> | Südlich Otter        | Großflächiger Grünlandbereich der Wümmeniederung mit meist mesophilem, z.T. intensiv genutztem Grünland / z. T. Feuchtgrünland / Teich / Graben / Gehölze / Kleinwälder  |            | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Pufferzone für wertvolle Kernbereiche  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">662</a> | Südlich Otter        | Oberlauf der Wümme, teilweise begradigt / Güteklasse II / mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Ufergehölze  | Fischotter | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                                | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">663</a> | Westlich NSG "Obere Wümmeniederung" | Feucht- und Nasswiesen / Bruchwäldchen / Grünland / Sumpf- und Röhrichtvegetation / durch kleine Straße von NSG getrennt  |  | Pufferbereich zu hochwertigem NSG / kleine Tümpel  | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">664</a> | Südlich Otter                       | Von Grünland umgebener Birkenbruch auf degeneriertem Hochmoor / Feuchtgrünland / Feuchtbrache / verlandende Torfstiche / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium / Teich / Entwässerungsgraben |  | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">665</a> | Südlich Welle                       | Estetal mit begradigtem Verlauf der Este / Gütekategorie II / überwiegend Grünland / z.T. Acker / Fischteich  | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">666</a> | Südlich Welle                       | Quellmoorbereich im Estetal / unterhalb aufgestauter Teich / Gehölze  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet seltener Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">667</a> | Südwestlich Groß Todtshorn          | Erlen-Birkenbruchwald, leicht degeneriert   |  | NSG: Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">668</a> | Südwestlich Groß Todtshorn          | Erlen-Birkenbruchwald / Grünland / Feuchtgrünlandbrache   |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">669</a> | Südlich Groß Todtshorn              | Kiefernforst  |  | Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">670</a> | Südlich Groß Todtshorn              | Abgrabungsgewässer, stark verkrautet  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">671</a> | Südlich Ottermoor                   | Moorheide / Sandheide / Brachgrünland / Sandtrockenrasen / mesotrophes Stillgewässer / Kiefernbestände  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">672</a> | Südlich Ottermoor                   | Heidemoor / von Dünen und Mulden reliefiertes Gebiet / oligotrophe Stillgewässer / Hochmoorvegetation / Moorheide / Birkenbruch / Feuchtgebüsch / Sonstiger Magerrasen / Tümpel                     | Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon) und Hochmoorbläuling (Plebeius optilete) (1981), Anthericum ramosum | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Libellenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten | 1    | LRP 94, NLWKN Flora, Fauna    |
| <a href="#">673</a> | Nördlich Wintermoor                 | Eutropher, stark verkrauteter Teich im Grünland / Seggenried  |  | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet von Wasservögeln   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">674</a> | Östlich Ottermoor                   | Quellgebiet der Este / temporäres, begradigtes Fließgewässer / degeneriertes Hochmoor / Feuchtgebüsch / Feuchtgrünland / Seggenried / Birken- und Kiefernwald entwässerter Moore                    |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |

| ID                  | Lage                               | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">675</a> | Nördlich Wintermoor an der Chausee | Hangbereich am Bahndamm   |  | Lebensraum gefährdeter Reptilienarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">676</a> | Östlich Seppensen                  | Tal des Steinbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / nährstoffarmer Sumpf / Erlenbruchwald / Teich  | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1994) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken-, Libellen- und Schmetterlingsarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">677</a> | Südlich Seppensen                  | Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">678</a> | Südlich Seppensen                  | Bachtal / begradigtes Fließgewässer / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruch-Fragmente  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">679</a> | Südwestlich Jesteburg              | Begradigter kleiner Bach / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände   |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">680</a> | Westlich Jesteburg                 | Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Teich / Acker   | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                        |
| 680b                | Westlich Jesteburg                 | Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze / Teich / Acker   | Fischotter, Weißstorch                               | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Weißstorch  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">681</a> | Südlich Jesteburg                  | Brettbachtal / teils begradigtes, teils naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / brach gefallenes Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch / Graben / Teich / Birken- und Kiefern-Bruchwald |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibien- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">682</a> | Südwestlich Asendorf               | Brettbachtal / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Fischteichanlage / Gehölzbestände  |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">683</a> | Südwestlich Asendorf               | Nasswiese im Kiefernforst   | Pedicularis sylvatica                                | Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora                   |
| <a href="#">684</a> | Südwestlich Asendorf               | Ehemalige Abgrabung / kleinflächig Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Kiefern-aufforstung   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |

| ID                  | Lage                       | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|----------------------------|---|--|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">685</a> | Südwestlich Asendorf       | Brettbachtal / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Grünland / Ufergehölze / Fischteichanlagen / Schwimmblattvegetation / Sumpfwald / Moor- und Sumpfbüsch / naturnahes Gewässer |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">686</a> | Nördlich Asendorf          | Überwiegend mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Graben / Kleinwälder / Gehölzreihen / Teiche  |  | Pufferzone für wertvolle Kernbereiche / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Libellenarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">687</a> | Südwestlich Holm-Seppensen | Büsen-Bachtal / Sandheide / kleinflächig Moorheide / Borstgrasrasen / oligotropher Bach / Gehölzbestände  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort seltener Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">688</a> | Östlich Holm-Seppensen     | Tal des Steinbaches, Unterlauf / großer Stau-<br>teich / Röhricht / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / degenerierter Erlenbruch / randlich Nadel-Laubmischwald / Auen- und Quellwald  | Großer Schillerfalter ( <i>Apatura iris</i> ) (1991) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">689</a> | Südlich Holm-Seppensen     | Moorheide / Birkenbruch / oligotrophes Stillgewässer / Gehölzbestände   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">690</a> | Südlich Holm-Seppensen     | Pulverbach-Tal / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / teilweise zu Fischteichen aufgestaut / randlich Nadel-Laubmischbestände, z.T. erlenbruchartig / Grünland  |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">691</a> | Südlich Thelstorf          | Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / Erlenbruchwald / Quellwald / Nadel-Laubmischwald / Teiche  | Fischotter, Schwarzstorch                            | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Wandergebiet gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">692</a> | Östlich Wörme              | Erlenbruch / Feuchtwiese / Nadel-Laubmischwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">693</a> | Nördliche Weihe            | Erlenbruchwald / Teiche / brach gefallenes Feuchtgrünland   |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">694</a> | Östlich Schierhorn         | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / kleine Feuchtwälder / Teich / Graben   |  | Natürliche Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Wanderraum für Amphibien  | 2    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-----------------------|--|---|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">695</a> | Südlich Schierhorn    | Extensive Fischteiche / Erlen-Birken-Kiefern-Bruchwald / Feuchtgebüsch   |   | NSG: Naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">696</a> | Südöstlich Schierhorn | Hangmoor Schierhorn / Hochmoorvegetation / Moorheide / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtbrache / Kiefernforst  | Lungenenzianbläuling (Maculinea alcon), Dactylorhiza spagnicola | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien-, Reptilien- und Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten                          | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">697</a> | Südwestlich Asendorf  | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturierter Grünlandbereich / Quellbereich mit Gräben / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Erlen-Eschenwald / Feuchtgebüsch |   | Quellgebiet / z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">698</a> | Nordöstlich Höpen     | Nasswiese / Sumpfwald / Geestbach  |   | Möglichkeit zur Vernetzung hochwertiger Lebensräume   | 2    | Biotopkartierung 2009         |
| <a href="#">699</a> | Südlich Höpen         | Fischteiche  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">700</a> | Südlich Asendorf      | Brach gefallenes Feuchtgrünland / Graben / randlich Gehölzbestände   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">701</a> | Südöstlich Asendorf   | Durch Gehölzbestände gegliedertes Grünland / z.T. Feuchtgrünland / kleinflächig Seggenried / Graben / Teich / z.T. Acker   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung wertvoller Lebensräume für Brutvögel   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">702</a> | Südlich Asendorf      | Begradigter Lauf des Moorbaches / Güteklasse II / Grünland / Erlen-Eschenwald-Fragmente / Ufergehölze  |   | Mäßig belastetes Fließgewässer  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">703</a> | Nördlich Drumbergen   | Hochmoor / Moorheide / Pfeifengras-Stadium / Feuchtgebüsch / Torfstiche / oligotrophes Stillgewässer / Moor- und Sumpfgebüsch  |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">704</a> | Südlich Wörme         | Bodensaurer Buchen-Eichenwald  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">705</a> | Südlich Wümmen        | Nadelwald / Grünland / Seen  | Schwarzstorch   | Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel               |
| <a href="#">706</a> | Südlich Wörme         | Zu Fischteichen aufgestauter Bachlauf / geringes Röhricht / umgebend bodensaurer Eichen-Buchenwald   | Schwarzstorch   | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">707</a> | Südlich Wörme         | Erlenbruchwald / Übergänge zum Erlen-Eichen-Birkenwald und Birken-Eichenwald / brach gefallenes Feuchtgrünland / Seggenried / Sumpf  | Schwarzstorch   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch                           | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">708</a> | Nördlich Handeloh     | Acker (Randbereich)  | Arnosaris minima  | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                   |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                         |
|---------------------|----------------------|--|--|--|------|--------------------------------|
| <a href="#">709</a> | Nordöstlich Handeloh | Eutropher Teich im Grünland / Schwimmblattvegetation / Erlenbruch-Fragment / Nadel-Laubmischwald   | Schwarzstorch  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel        |
| <a href="#">710</a> | Nordöstlich Handeloh | Fischteichanlage mit z.T. extensiv genutzten Teichen / Schwimmblattzone / Gehölzbestände   |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">711</a> | Östlich Handeloh     | Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Ufergehölze                       | Fischotter, Schwarzstorch                            | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschrecken- und Libellenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel, Fauna |
| <a href="#">712</a> | Östlich Handeloh     | Zahlreiche, z.T. extensiv genutzte Fischteiche / Schwimmblattvegetation / Feuchtwälder / Nadel-Laubmischwald   |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">713</a> | Nördlich Inzmühlen   | Moorheide / Kiefern-Birkenbruch / Graben   | Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich                | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">714</a> | Östlich Holm         | Gehölzbestände / Grün- und Ackerland   | Schwarzstorch  | Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                |
| <a href="#">715</a> | Östlich Holm         | Bachtal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnah, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / degenerierte Feuchtheide / Erlenbruchwald-Fragmente / Grünland |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wanderraum für Amphibien / Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen  | 2    | LRP 94                         |
| 715b                | Östlich Holm         | Bachtal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnah, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / degenerierte Feuchtheide / Erlenbruchwald-Fragmente / Grünland | Schwarzstorch  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wanderraum für Amphibien und gefährdete Fischarten / Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel, Fauna         |
| <a href="#">716</a> | Südwestlich Holm     | Vorwiegend Grünland  | Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich, Schwarzstorch | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                |
| <a href="#">717</a> | Südöstlich Wörme     | Erlenbruchwald   |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                         |
| <a href="#">718</a> | Westlich Holm        | Talraum der Seeve / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Intensiv-Teichanlagen / Grünland / Ufergehölze   | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum / Wandergebiet für gefährdete Fischarten   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna            |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle              |
|---------------------|--------------------------|--|--|---|------|---------------------|
| <a href="#">719</a> | Südlich Holm             | Holmer Fischteiche / Extensiv-Fischteiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Feuchtwald / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte | Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich  | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brut-, Rast- und Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">720</a> | Südlich Holm             | Tal des Weseler Baches / zu kleinen Fischteichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation                            | Heidelerche, Schwarzkehlchen, Kranich  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94              |
| <a href="#">721</a> | Südöstlich Holm          | Grünland   |  | NSG: Lebensraum für Heuschrecken / Lebensraum für Libellen  | 2    | NLWKN Fauna         |
| <a href="#">722</a> | Südöstlich Holm          | Tal des Weseler Baches / zu großen Teichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / randlich Nadel- und Nadel-Laubmischwälder                                    |  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">723</a> | Südwestlich Schiehorn    | Bachtal / Oberlauf eines Nebenbaches der Seeve, begradigt / Güteklasse III / Intensiv-Fischteiche / Grünland   |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94              |
| <a href="#">724</a> | Südwestlich Dierkshausen | Eiszeitliche Rinne / Quellgebiet / Fließgewässer / Teich / Nadel-Laubmischwälder / Feuchtwald-Fragmente / Feuchtheide / Feuchtgrünland                               | Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibien- und Libellenarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">725</a> | Südlich Dierkshausen     | NSG Lüneburger Heide: Grünland / Forst / Heideflächen  | Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker | NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten  | 1    | NLWKN Brutvögel     |
| <a href="#">726</a> | Südwestlich Dierkshausen | Sandheide / Sandmagerrasen / Gebüsch   | Heidelerche, Raubwürger, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen, Wachtel, Ziegenmelker | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum Reptilienarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna |
| <a href="#">727</a> | Östlich Handeloh         | Fischteichanlage mit einigen extensiv genutzten Teichen  |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94              |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                  |
|---------------------|----------------------|---|--|--|------|-------------------------|
| <a href="#">728</a> | Östlich Handeloh     | Niederung der Seeve / durch zahlreiche Wälder und Gehölzgruppen strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Feuchtwälder / Teiche / Graben / Bachlauf |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                  |
| 728b                | Östlich Handeloh     | Niederung der Seeve / durch zahlreiche Wälder und Gehölzgruppen strukturiertes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Feuchtgebüsch / Feuchtwälder / Teiche / Graben / Bachlauf | Schwarzstorch  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">729</a> | Östlich Inzmühlen    | Tal eines Nebenbaches der Seeve / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschen-Quellwald  |  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">730</a> | Inzmühlen            | Talraum der Seeve / teilweise begradigtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Grünland / Ufergehölze / Fischteiche  | Fischotter, Schwarzstorch  | Gering belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | LRP 94, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">731</a> | Südlich Inzmühlen    | Waldgebiet an der Seeve   | Schwarzstorch  | Lebensraum Schwarzstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel         |
| <a href="#">732</a> | Südlich Inzmühlen    | Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald  | Fischotter   | NSG: Gering belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">733</a> | Östlich Inzmühlen    | Sandheide / z.T. Feuchtheide / Abgrabung  | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna     |
| <a href="#">734</a> | Südlich Inzmühlen    | NSG: Lüneburger Heide / Grünland / Forst / Heideflächen   | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen | NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN Brutvögel         |
| <a href="#">735</a> | Südöstlich Inzmühlen | Feuchtgrünland / Feuchtheide / Feuchtgebüsch  | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückenvürger, Schwarzkehlchen | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                  |



| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                           |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|------|----------------------------------|
| <a href="#">736</a> | Südlich<br>Inzmühlen    | Tal eines Nebenbaches der Seeve / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Ufergehölze / Heide / Nadelwald  | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückwürger, Schwarzkehlchen | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten  | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna        |
| <a href="#">737</a> | Südöstlich<br>Inzmühlen | Sandheide  | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Rebhuhn, Rotrückwürger, Schwarzkehlchen | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">738</a> | Östlich Wesel           | Sandheide / kleinflächig Feuchtheide / kleinflächig Wacholder-Gebüsch / lichte Eichen-Kiefernwälder / Gebüsch  | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Rebhuhn, Ziegenmelker, Grünspecht  | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna        |
| <a href="#">739</a> | Nordwestlich<br>Wesel   | Tal des Weseler Baches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Nadel-Laubmischwälder / Ufergehölze  |  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Wandergebiet gefährdeter Fischarten   | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna        |
| <a href="#">740</a> | Nördlich Wesel          | Quellbereich des Weseler Baches / temporäres Fließgewässer / Feuchtgrünland / Feuchtheide / nährstoffarmer Sumpf / im unteren Bereich Nadel-Laubmischwälder  |  | NSG: Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">741</a> | Nordöstlich<br>Wesel    | Tal des Weseler Baches / zu zahlreichen Teichen aufgestautes Fließgewässer / Güteklasse II / Quellbereich / oligotrophe Staugewässer / Schwimmblattvegetation / Birken-Erlenbruchwald-Fragmente / randlich Nadel-Laubmischwälder | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Rebhuhn, Ziegenmelker, Grünspecht  | NSG: Quellgebiet / mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten                | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Flora, Fauna |
| <a href="#">742</a> | Südwestlich<br>Hanstedt | Quellbachtal mit Randmoorbereichen in großflächigem Waldgebiet   |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora                   |
| <a href="#">743</a> | Östlich Wesel           | Bodensaure Nadel-Laubmischwälder mit vergleichsweise hohem Laubholzanteil  |  | NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">744</a> | Nordwestlich<br>Ollsen  | Quellgebiet / kleiner Bachlauf / Stauteiche / Schwimmblattvegetation   |  | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Libellenarten   | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna        |
| <a href="#">745</a> | Südlich<br>Handeloh     | Sandheide / Feuchtheide / Wacholderbestände / Gebüsch / Grünland / z.T. Acker / im Süden Torfstich   |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94,<br>Fauna                 |
| <a href="#">746</a> | Südlich<br>Inzmühlen    | Schlatt / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium   |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                           |

| ID                  | Lage              | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-------------------|---|---|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">747</a> | Südlich Handeloh  | Trockenstandort beiderseits der Bahntrasse / Sandtrockenrasen / Trockenbrache / Gehölzbestände  | Anthericum ramosum, Botrychium lunaria, Arctostaphylos uva-ursi         | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Tagfalter / Lebensraum für Heuschrecken   | 1    | LRP 94, Fauna                 |
| <a href="#">748</a> | Südlich Inzmühlen | Kleinere offene Wasserflächen / Moorheide / Pfeifengras-Degenerationsstadium  | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals                   | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">749</a> | Südlich Inzmühlen | Talraum der Seeve / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Röhricht / Seggenried / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel / Ufergehölze | Fischotter, Schwarzstorch   | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">750</a> | Südlich Inzmühlen | Waldgebiet an der Seeve   | Schwarzstorch   | Lebensraum Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel               |
| <a href="#">751</a> | Südlich Inzmühlen | Moorheide   |   | NSG: Vorkommen gefährdeter Amphibien- und Libellenarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">752</a> | Südwestlich Wesel | Sandheide / Gebüsche  | Heidelerche, Rotrückenvürger, Ziegenmelker, Schwarzkelchen              | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten   | 1    | LRP 94, Fauna                 |
| <a href="#">753</a> | Westlich Wesel    | Moorheide / Feuchtgrünland / degenerierter Birkenbruch mit Entwicklung zum feuchten Eichen-Birkenwald   | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals                   | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">754</a> | Westlich Wesel    | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet / z.T. Feuchtgrünland / z.T. brach gefallenes Feuchtgrünland / Tümpel / z.T. Acker   | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals                   | NSG: Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Wanderraum für Amphibien   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">755</a> | Westlich Wesel    | Vorwiegend Kiefernforst / Acker   | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Wendehals                   | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN Brutvögel               |
| <a href="#">756</a> | Südlich Wehlen    | Unterlauf des Rehmbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse I - II / Grünland / Ufergehölze   | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Ziegenmelker, Schwarzstorch | NSG: Gering belastetes Fließgewässer / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung  | Wert | Quelle                          |
|---------------------|----------------------|--|---|--|------|---------------------------------|
| <a href="#">757</a> | Südöstlich Wehlen    | Quellbereich des Rehmbaches / naturnahes Fließgewässer / vermoorte Fließrinne / randlich Heide   | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Ziegenmelker, Schwarzkehlchen, Wachtel, Kranich, Schwarzstorch | NSG: Quellgebiet / gering belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna             |
| <a href="#">758</a> | Südöstlich Wehlen    | Sandheide / Krähenbeerenheide / kleiner Kiefernbestand   | Grünspecht, Heidelerche, Raubwürger, Ziegenmelker, Schwarzkehlchen, Wachtel, Kranich, Schwarzstorch | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94                          |
| <a href="#">759</a> | Südlich Wehlen       | Quellgebiet der Seeve / naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Quellhochmoore / Feuchtgrünland / oligotrophe Tümpel / Feuchtgebüsch / Grünland / Ufergehölze | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kranich, Ziegenmelker, Schwarzstorch, Fischotter                 | NSG: Quellgebiet / mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände und gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Nahrungs- und Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / potentieller Lebens- und Wander- raum des Fischotters | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna             |
| <a href="#">760</a> | Südlich Wehlen       | Mit lockerem, schwachwüchsigem Kiefernalt- holz bestocktes Dünenal / Sandtrockenrasen / Calluna-Heide / offene Sandflächen                                       |   | NSG: Wald mit Bedeutung als Forschungsobjekt / gefährdete Vegetationsbestände / Standort seltener Pflanzenarten  | 1    | LRP 94, Biotopkartie- rung 2009 |
| <a href="#">761</a> | Südlich Wehlen       | Quellgebiet / Feuchtgrünlandbrache / Tümpel  |   | NSG: Quellgebiet / Brutgebiet gefährdeter Vogel- arten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und seltener Amphibienarten / Lebensraum für Libellen   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna             |
| <a href="#">762</a> | Südlich Wehlen       | Gehölzbestände   | Grünspecht, Heidelerche, Kolkrabe, Kra- nich, Ziegenmelker, Schwarzstorch                           | NSG: Brutgebiet gefährdeter Vogelarten, Nahrungs- habitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN Brutvögel                 |
| <a href="#">763</a> | Nördlich Heimbuch    | Sandheide / Sandmagerasen / Kiefern- und Birkenanflug  |   | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbe- stände / Vorkommen gefährdeter Reptilienarten / Vorkommen gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna             |
| <a href="#">764</a> | Nordwestlich Undeloh | Gehölzbestände   | Heidelerche, Raub- würger, Schwarz- kehlchen, Ziegenmel- ker  | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten  | 2    | NLWKN Brutvögel                 |
| <a href="#">765</a> | Westlich Undeloh     | Bodensaurer Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil   |   | NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Wald- gesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                          |

| ID                  | Lage                      | Kurzbeschreibung  | Arten      | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------------|---|------------|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">766</a> | Westlich Undeloh          | Bodensaurer Eichen-Buchenwald   |            | NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">767</a> | Westlich Undeloh          | Bodensaurer Nadel-Laubmischwald   |            | NSG: Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">768</a> | Nordöstlich Schmalenfelde | Grünlandgebiet / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Gehölzbestände  |            | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">769</a> | Westlich Schmalenfelde    | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze   | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">770</a> | Östlich Asendorf          | Unterlauf des Moorbaches / Intensiv-Fischteiche / Grünland / Ufergehölze  |            | Mäßig belastetes Fließgewässer   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">771</a> | Südlich Schmalenfelde     | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Teich                                       | Fischotter | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum                    | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">772</a> | Südöstlich Asendorf       | Moorbachtal / z.T. naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / brach gefallenes Feuchtgrünland / degenerierter Erlenbruch / Tümpel                                   |            | Mäßig belastetes Fließgewässer / naturnahe Lebensräume / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten / Lebensraum für Reptilien   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">773</a> | Südlich Brackel           | Eutropher Tümpel im Grünland / mäßige Schwimmblattvegetation / mäßige Röhrichtvegetation / Gehölzbestände / randlich Acker  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">774</a> | Östlich Brackel           | Ehemalige Tongrube / mesotrophe Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Pionierstadien (wechsel-) nasser Standorte / junger Eichen-Birkenwald |            | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">775</a> | Südöstlich Brackel        | Kleines Bachtälchen im bodensauren bis mesophilen Buchenwald / im unteren Bereich Feuchtbrache  |            | Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">776</a> | Südöstlich Brackel        | Teich, umgeben von Grünland   |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">777</a> | Südlich Brackel           | Tümpel, umgeben von Grünland  |            | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">778</a> | Südöstlich Brackel        | Bachtälchen im Nadel-Laubmischwald  |            | Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">779</a> | Südlich Brackel           | Erlen-Eschen-Quellwald / bodensaurer Buchenwald   |            | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">780</a> | Südöstlich Brackel        | Kleines Bachtal im Nadel-Laubmischwald  |            | Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                | Kurzbeschreibung  | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|---------------------|---|--|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">781</a> | Tangendorf          | Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Gehölzbestände   |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">782</a> | Östlich Tangendorf  | Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Teich |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Reptilien- und Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">783</a> | Tangendorf          | Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Gehölzbestände   |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">784</a> | Südlich Tangendorf  | Ackerrandstreifen / Graben  |  | Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                   |
| <a href="#">785</a> | Südlich Tangendorf  | Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch / Graben  |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">786</a> | Südwestlich Wulfsen | Tal des Aubaches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Erlenbruchwald                                  | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Schmetterlingsarten                            | 1    | LRP 94, NLWKN Flora und Fauna |
| <a href="#">787</a> | Südwestlich Wulfsen | Großflächiges Waldgebiet  | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992) | Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten  | 2    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">788</a> | Südwestlich Wulfsen | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried             |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten  | 2    | LRP 94, FFH                   |
| 788b                | Südwestlich Wulfsen | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried             |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Fischarten  | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">789</a> | Östlich Tangendorf  | Tal eines Nebenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Fischteich         |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94, FFH                   |

| ID                  | Lage                              | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|-----------------------------------|---|---|---|------|-----------------------|
| <a href="#">790</a> | Südwestlich Wulfsen               | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschen-Quellwald / Weiden-Auwald-Fragment / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter ( <i>Brenthis ino</i> ), (1992) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten                     | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">791</a> | Luhenederung, südwestlich Balburg | NSG Bahlburger Bruch: mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / Erlen-Eschenwald im Übergang zum Erlenbruchwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Feuchtgrünlandbrache     |   | NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Schmetterlingsarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">792</a> | Nördlich Garstedt                 | Eichen-Hainbuchenwald   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Biotope |
| <a href="#">793</a> | Nordöstlich Dierkshausen          | Nebenbach des Moorbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / degenerierte Erlenbruchwälder / Ufergehölze                                       |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">794</a> | Westlich Quarrendorf              | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Nadel-Laubmischwald / Ufergehölze   | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">795</a> | Nordöstlich Dierkshausen          | Degenerierter Erlenbruch im Übergang zum Erlen-Eschenwald / Feuchtgrünland  |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Möglichkeit zur Entwicklung gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">796</a> | Westlich Quarrendorf              | Verlandeter Altarm der Schmalen Aue / Sumpf / Feuchtheide / Erlen-Birkenbruchwald / Nadelforst  | Fischotter  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">797</a> | Nördlich Hanstedt                 | Tal der Schmalen Aue / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Pappel-Erlenwald  | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort seltener Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">798</a> | Östlich Dierkshausen              | Nebenbach des Moorbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Nadel-Laubholz-Bestände / Acker / Grünland / Ufergehölze                                     |   | Mäßig belastetes Fließgewässer  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">799</a> | Nordöstlich Hanstedt              | Tal der Schmalen Aue / teilweise naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Pappel-Erlenwald  | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort seltener Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">800</a> | Nordöstlich Hanstedt              | Tal der Schmalen Aue / teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlen-Eschenwald / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland                                    | Fischotter  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">801</a> | Östlich Quarrendorf               | 3 Laubwaldbereiche / bodensaurer Buchenwald im Übergang zum Eichen-Hainbuchenwald und mesophilen Buchenwald   |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">802</a> | Östlich Hanstedt                  | Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Teich   |   | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94                |

| ID                  | Lage                  | Kurzbeschreibung  | Arten | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-----------------------|---|-------|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">803</a> | Östlich Quarrendorf   | Fischteichanlage mit mehreren Staugewässern, z.T. extensiv / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Ufergehölze  |       | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellen  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna           |
| <a href="#">804</a> | Südlich Brackel       | Nadel-Laubmischwald mit hohem Anteil an Kleingewässern / im Norden durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet   |       | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebens- und Wanderraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten / in Quelltälern Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten | 2    | LRP 94, NLWKN Flora           |
| <a href="#">805</a> | Östlich Quarrendorf   | Kleiner Bachlauf mit randlichem Feuchtgrünland im Nadelforst  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">806</a> | Östlich Hanstedt      | Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald   |       | Quellgebiet / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">807</a> | Östlich Hanstedt      | Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald   |       | Quellgebiet / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">808</a> | Südlich Tangendorf    | Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturiertes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit hohem Grünlandanteil / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Grünlandbrache / Acker / Laubwald / Nadelwald / Graben / Teich |       | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">809</a> | Südöstlich Tangendorf | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Feuchtgrünlandbrache  |       | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">810</a> | Nördlich Toppenstedt  | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich / Graben / Gehölzbestände  |       | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">811</a> | Toppenstedt           | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Gehölzbestände / Fischteiche  |       | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für Amphibien   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">812</a> | Toppenstedt           | Feuchtgrünlandbrache  |       | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Reptilienarten  | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">813</a> | Östlich Toppenstedt   | Eutropher Teich im Grünland / Röhrichtvegetation  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">814</a> | Westlich Hanstedt     | Erlen-Eschenwald / kleiner Bachlauf   |       | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">815</a> | Westlich Hanstedt     | Bodensaurer Eichen-Buchenwald   |       | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 2    | LRP 94                        |
| <a href="#">816</a> | Westlich Hanstedt     | Teich, umgeben von Laub- und Nadelwald  |       | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna                   |

| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                                    |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|------|---|
| <a href="#">817</a> | Östlich Hanstedt        | Durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes, überwiegend grünlandgenutztes Gebiet / z.T. Feuchtgrünland / kleinere Bachläufe / Feuchtgebüsch / Nadel-Laubmischwald               |  | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">818</a> | Östlich Hanstedt        | Großer Bach / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Ufergehölze  |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">819</a> | Östlich Hanstedt        | Fischteiche, extensiv genutzt / eutrophe Stillgewässer / oligotrophe Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgrünland / Erlen- und Kiefernbestände / Sumpfwald |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten              | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">820</a> | Südlich Hanstedt        | Tal der Schmalen Aue / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gehölzbestände                                      | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / Lebensraum und Rastbiotop gefährdeter Vogelarten / potentieller Fischotter-Lebensraum         | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">821</a> | Östlich Hanstedt        | Bachlauf in einem Laubwald-Streifen  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">822</a> | Südlich Hanstedt        | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland  | Fischotter   | Mäßig belastetes Fließgewässer / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">823</a> | Südlich Brackel         | Nadel-Laubmischwald mit hohem Anteil an Kleingewässern / im Norden durch Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet  |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebens- und Wanderraum gefährdeter Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Greifvogelarten         | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">824</a> | Südwestlich Toppenstedt | Tümpel in Bachnähe / Weiher / Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | Biotopkartierung 2009                     |
| <a href="#">825</a> | Östlich Hanstedt        | Bodensaures, im Übergang zum mesophilen Nadel-Laubmischwaldgebiet mit vergleichsweise hohem Laubholzanteil   |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften  | 2    | LRP 94, FFH, Fauna, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">826</a> | Östlich Hanstedt        | Bodensaurer Eichen-Buchenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">827</a> | Westlich Toppenstedt    | Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum Eichen-Hainbuchenwald  |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">828</a> | Südwestlich Toppenstedt | Aufgestaute Teiche / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                                    |
| <a href="#">829</a> | Nördlich Garlstorf      | Tal eines Seitenbaches des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Grünland / Gehölzbestände  |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume   | 2    | LRP 94                                    |
| <a href="#">830</a> | Südlich Toppenstedt     | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragment / Graben   | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1992) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten          | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                       |



| ID                  | Lage                      | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|---------------------------|--|--|---|------|-----------------------|
| 830b                | Südlich<br>Toppenstedt    | Tal des Aubaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Erlenbruch-Fragment / Graben | Feuchtwiesen-Perlmutterfalter ( <i>Brenthis</i> ), (1992), Schwarzstorch             | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">831</a> | Nordwestlich<br>Garstorf  | 2 Teiche, Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche   |  | Lebensraum für Libellen   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">832</a> | Südöstlich<br>Toppenstedt | Eutropher Teich im Grünland  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna   |
| <a href="#">833</a> | Südlich<br>Hanstedt       | Bachlauf mit Fischteich-Kette / intensive Fischteiche, wenig strukturiert / Grünland / Nadel-Laubholzwald                                      |  | Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">834</a> | Südlich<br>Hanstedt       | Brach gefallenes Feucht- bis Nassgrünland  |  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">835</a> | Südlich<br>Hanstedt       | Bachlauf mit Fischteich-Kette / intensive Fischteiche, wenig strukturiert / Grünland / Nadel-Laubholzwald                                      |  | Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">836</a> | Westlich<br>Nindorf       | Acker (Randbereich)  | <i>Arnoseris minima</i> ,<br><i>Galeopsis segetum</i> ,<br><i>Hypochaeris glabra</i> | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">837</a> | Nördlich Ollsen           | Oligotrophes bis mesotrophes Staugewässer / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Bachlauf / Feuchtbrache                              |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten                        | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">838</a> | Nördlich Ollsen           | Teich / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Bachlauf / randlich Gehölze  |  | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Lebensraum gefährdeter Libellenarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">839</a> | Nördlich<br>Nindorf       | Niederung des Nordbaches / Mischwald / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch   |  | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Biotope |
| <a href="#">840</a> | Nördlich<br>Nindorf       | Niederung des Nordbaches / überwiegend begradigtes Fließgewässer / 7 Teiche / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Gebüsch       |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum für Amphibienarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">841</a> | Nindorf                   | Mauerfuss  | <i>Leonurus cardiaca</i>   | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">842</a> | Südöstlich<br>Nindorf     | Mesophiler Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / Quellgebiet / zahlreiche kleine Bäche  |  | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">843</a> | Südlich<br>Nindorf        | Tal des Hummingen-Baches / Laubwald  | Laubholz-Säbelschrecke   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Wandergebiet für Amphibienarten   | 2    | NLWKN Fauna           |

| ID                  | Lage                   | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                     |
|---------------------|------------------------|--|---|---|------|----------------------------|
| <a href="#">844</a> | Südlich Nindorf        | Tal des Hummingen-Baches / zu zahlreichen Fischteichen aufgestauter Bachlauf / z.T. naturnaher Verlauf / Güteklasse II / Grünlandvegetation / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Grünland |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Wandergebiet für Amphibienarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna        |
| <a href="#">845</a> | Südöstlich Nindorf     | Mesophiler Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / Quellgebiet / zahlreiche kleine Bäche  | Großer Schillerfalter ( <i>Apatura iris</i> ) (1992)                            | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten  | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna        |
| 845b                | Südöstlich Nindorf     | Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald  | Trichocolea tomentelle  | Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN Flora                |
| <a href="#">846</a> | Westlich Nindorf       | Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / Ufergehölze / Erlenbruch-Fragmente  | Fischotter, Schwarzstorch   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">847</a> | Südlich Nindorf        | Tal des Hummingen-Baches / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / brach gefallenes Feuchtgrünland / Erlenbruchwald / Nadel-Laubmischwald                                |   | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                     |
| <a href="#">848</a> | Nordöstlich Nindorf    | Quellgebiet / kleiner Bach / Nadel-Laubmischwald   | Großer Schillerfalter ( <i>Apatura iris</i> ) (1992), <i>Bazzania trilobata</i> | Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Flora, Fauna |
| <a href="#">849</a> | Westlich Garlstorf     | Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">850</a> | Westlich Garlstorf     | Nadel-Laubmischwald mit überwiegendem Nadelholzanteil / Quellgebiet / kleine Bäche / Grünland  |   | Quellgebiet / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten  | 2    | LRP 94                     |
| <a href="#">851</a> | Westlich Garlstorf     | Fichtenwald  | Dicranodontium denudatum  | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                |
| <a href="#">852</a> | Südöstlich Nindorf     | Kleiner Bach im Nadel-Laubmischwald  | Großer Schillerfalter ( <i>Apatura iris</i> )                                   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten   | 1    | LRP 94                     |
| <a href="#">853</a> | Westlich Garlstorf     | Bachtal im Fichtenwald   | Dicranodontium denudatum  | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                |
| <a href="#">854</a> | Westlich Garlstorf     | Größere Ruderalfläche / randlich Gehölze und Teiche / Trockenrasen / Zwergstrauchheide   |   | Lebensraum für Libellen und Reptilienarten / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Trockenstandorte  | 2    | Biotopkartierung 2009      |
| <a href="#">855</a> | Nördlich Gödenstorf    | Sandtrockenrasen / Heide-Fragmente / Gehölzbestände  |   | Lebensraum für Reptilien und wärmeliebende Insektenarten / Vorkommen gefährdeter Schmetterlingsarten  | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna        |
| <a href="#">856</a> | Nordöstlich Gödenstorf | Ackerfläche  | Hypochaeris glabra  | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora                |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung   | Arten                                       | Bedeutung  | Wert | Quelle                    |
|---------------------|--------------------------|--|---|--|------|---------------------------|
| <a href="#">857</a> | Westlich Ollsen          | Teich, als Viehtränke genutzt, an Forst grenzend   |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna            |
| <a href="#">858</a> | Südlich Ollsen           | Ackerfläche  | Hypochaeris glabra                          | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora            |
| <a href="#">859</a> | Südlich Ollsen           | Ackerfläche  | Hypochaeris glabra                          | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora            |
| <a href="#">860</a> | Nordöstlich Schätzendorf | Kleinstrukturierte Landschaft / Wechsel von Grünland, Acker, Kleinwäldern und Gehölzen / Quellgebiet / kleine Bachläufe / bodensaure und mesophile Buchenwäldchen / Nadel-Laubmischwäldchen / Teich / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch |   | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 2    | LRP 94                    |
| <a href="#">861</a> | Nordöstlich Schätzendorf | Mesophiler Buchenwald  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                    |
| <a href="#">862</a> | Östlich Ollsen           | Ackerfläche  | Hypochaeris glabra                          | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora            |
| <a href="#">863</a> | Nordöstlich Schätzendorf | Kleinstrukturierte Landschaft / Wechsel von Grünland, Acker, Kleinwäldern und Gehölzen / Quellgebiet / kleine Bachläufe / bodensaure und mesophile Buchenwäldchen / Nadel-Laubmischwäldchen / Teich / Feuchtgrünland / Feuchtgebüsch |   | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Quellgebiet / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 2    | LRP 94                    |
| <a href="#">864</a> | Westlich Garlstorf       | Quelliges Bachtal im Fichtenwald   |   | Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | NLWKN<br>Flora            |
| <a href="#">865</a> | Nordöstlich Schätzendorf | Bodensaurer Buchenwald / z.T. Nadel-Laubmischwald  | Großer Schillerfalter (Apatura iris) (1992) | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten  | 1    | LRP 94,<br>NLWKN<br>Fauna |
| <a href="#">866</a> | Südwestlich Garlstorf    | Nadel-Laubmischwald mit hohem Laubholzanteil / bodensaurer Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / Quellgebiet / kleine Bäche   |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten | 2    | LRP 94                    |
| <a href="#">867</a> | Nordöstlich Schätzendorf | Bodensaurer Buchenwald / Nadel-Laubmischwald / kleiner Bach  |   | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | LRP 94                    |
| <a href="#">868</a> | Östlich Schätzendorf     | Kleiner Bachlauf im Nadel-Laubmischwald  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                    |
| <a href="#">869</a> | Südwestlich Garlstorf    | Kleiner Bach mit Erlen-Eschenwald-Saum im Nadel-Laubmischwald  |   | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten  | 2    | LRP 94                    |
| <a href="#">870</a> | Westlich Gödenstorf      | Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturierte landwirtschaftliche Nutzfläche mit überwiegendem Grünlandanteil / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Nadel-Laubmischwald / Sumpfwald / mesophiles Grünland / Acker                 |   | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten  | 2    | LRP 94                    |

| ID                  | Lage                     | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                           |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|------|----------------------------------|
| <a href="#">871</a> | Südwestlich<br>Garlstorf | Kleiner Bach im Laubwald   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">872</a> | Nördlich<br>Lübberstedt  | Eutropher Teich im Grünland  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">873</a> | Nördlich<br>Lübberstedt  | Bodensaurer Buchenwald   |  | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">874</a> | Südlich<br>Gödenstorf    | Eutropher Teich / randlich Acker / randlich Gehölzbestände   |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">875</a> | Südlich<br>Gödenstorf    | Mehrere eutrophe Tümpel im Grünland / Röhrichtvegetation / randlich Acker  |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">876</a> | Südlich<br>Gödenstorf    | Ehemalige Abgrabung / Abgrabungsgewässer / Gehölzbestände / Ruderalvegetation  |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">877</a> | Südlich<br>Gödenstorf    | Eutropher Tümpel im Acker / Röhrichtvegetation   |  | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">878</a> | Oelstorf                 | Tal eines Nebenbaches des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / mesophiles Grünland / Feuchtgrünland / Acker / Erlenbruch-Fragmente           | Fischotter, Feuchtwiesen-Perlmutterfalter (Brenthis ino), (1991) | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten   | 2    | LRP 94                           |
| <a href="#">879</a> | Nördlich<br>Eyendorf     | Tal des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Seggenried / Gehölzbestände / Graben / Teich |  | Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fischarten Brutbiotop und Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94                           |
| <a href="#">880</a> | Westlich<br>Sahrendorf   | Fischteiche, umgeben von Wald  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna                   |
| <a href="#">881</a> | Westlich<br>Sahrendorf   | Gehölzbestände / Grün- und Ackerland   | Schwarzstorch  | Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | NLWKN<br>Brutvögel               |
| <a href="#">882</a> | Östlich<br>Undeloh       | Sandheide / trockene Grünlandbrache  | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkelchen                          | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94,<br>Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">883</a> | Östlich<br>Undeloh       | Teich, umgeben von Grünland  |  | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN<br>Fauna                   |
| <a href="#">884</a> | Östlich<br>Undeloh       | Gehölzbestände / Grün- und Ackerland   | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkelchen                          | Brut- und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN<br>Brutvögel               |
| <a href="#">885</a> | Westlich<br>Schätzendorf | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze  | Fischotter   | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 1    | LRP 94                           |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung  | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                  |
|---------------------|----------------------|---|---------|---|------|-------------------------|
| <a href="#">886</a> | Östlich Schätzendorf | Durch Kleinwälder und Gehölzbestände gut strukturierter Landschaftsraum mit hohem Grünlandanteil / mesophiler Buchenwald mit teilweise Übergang zum bodensauren Buchenwald / Quellgebiet / kleine Bäche / Teich |         | Quellgebiet / gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">887</a> | Nordöstlich Egestorf | Eutropher Tümpel, umgeben von Ackerland / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch   |         | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / gute Vegetationszonierung / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten | 1    | NLWKN Fauna             |
| <a href="#">888</a> | Auf den Riepen       | Teich in unmittelbarer Umgebung eines Schwimmbades  |         | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna             |
| <a href="#">889</a> | Westlich Egestorf    | Sandheide / Gebüsch   |         | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">890</a> | Nördlich Lübberstedt | Durch Grünland unterbrochener Nadel-Laubmischwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald / kleiner Bachlauf / Feuchtgrünland / Teich   |         | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">891</a> | Nördlich Lübberstedt | Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald   |         | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">892</a> | Nördlich Lübberstedt | Bodensaurer Eichen-Buchenwald im Übergang zum mesophilen Buchenwald   |         | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">893</a> | Westlich Eyendorf    | Eutropher Tümpel, umgeben von Brachgrünland / Röhrichtvegetation / randlich Acker   |         | Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten  | 1    | NLWKN Fauna             |
| <a href="#">894</a> | Marxen-Bahlburg      | Stillgelegte Güterbahnstrecke / ungenutztes linienförmiges Element / Ruderalvegetation / Pionierstadien / Gebüsch   |         | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher wärmeliebender Insektenarten / Biotopvernetzung                                 | 2    | LRP 94, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">895</a> | Östlich Garstedt     | Eichen-Hainbuchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald   |         | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften  | 1    | LRP 94, NLWKN Biotope   |
| <a href="#">896</a> | Nördlich Vierhöfen   | Kleines, weitgehend naturnahes Hochmoor / Tümpel / randlich Pfeifengras-Degenerationsstadien  |         | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphien- und Schmetterlingsarten   | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">897</a> | Nördlich Vierhöfen   | Kleines, weitgehend naturnahes Hochmoor / Tümpel / randlich Pfeifengras-Degenerationsstadien  | Kranich | Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphien- und Käferarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">898</a> | Nördlich Vierhöfen   | Röhrichtvegetation / nährstoffarmer Sumpf / Seggenried / Feuchtwiese  |         | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten                                  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">899</a> | Nördlich Vierhöfen   | Grünlandgebiet  | Kranich | Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN Brutvögel         |

| ID                  | Lage                | Kurzbeschreibung  | Arten       | Bedeutung  | Wert | Quelle                  |
|---------------------|---------------------|---|-------------|--|------|-------------------------|
| <a href="#">900</a> | Nördlich Vierhöfen  | Pfeifengras-Degenerationsstadium  |             | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten  | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">901</a> | Nördlich Vierhöfen  | Birken-Kiefern-Bruchwald, umgeben von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen / Feuchtgrünland  |             | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände  | 2    | Biotopkartierung 2009   |
| <a href="#">902</a> | Östlich Vierhöfen   | Heidevegetation / Trockenbrache   | Heidelerche | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 2    | Biotopkartierung 2009   |
| <a href="#">903</a> | Östlich Vierhöfen   | Wald- und Agrargebiet um Heideflächen (Nr. 902, 907)  | Heidelerche | Lebensraum Heidelerche   | 2    | NLWKN Brutvögel         |
| <a href="#">904</a> | Südöstlich Garstedt | Talraum eines kleinen Baches / naturnahes Fließgewässer / Erlenbruchwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Nadelwald / Teiche  |             | Naturnahes Fließgewässer / Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">905</a> | Südöstlich Garstedt | Durch Kleinwälder gut strukturiertes Grünlandgebiet / z.T. Acker / naturnahes Fließgewässer / Fischteiche   |             | Vorkommen naturnaher Lebensräume / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">906</a> | Südöstlich Garstedt | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Bachlauf / Fischteiche   |             | Vorkommen naturnaher Waldgesellschaften / Quellgebiet / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">907</a> | Östlich Vierhöfen   | Heidevegetation / Trockenbrache / Gehölzbestände / randlich Nadelforst  | Heidelerche | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten  | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">908</a> | Schnede             | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / Fischteiche   |             | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Lebensraum und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">909</a> | Nördlich Salzhausen | Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / bodensaurer Eichen-Buchenwald / Staugewässer / Graben   |             | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten  | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">910</a> | Nördlich Salzhausen | Ehemalige Sandabgrabung / trockene Pionierstadien / Trockenbrache / offene Sandflächen / Tümpel / Schwimmblattvegetation / Röhrichtvegetation / Feuchtgebüsch                     |             | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Libellen- und Schmetterlingsarten / Lebensraum zahlreicher Heuschreckenarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna     |
| <a href="#">911</a> | Westlich Vierhöfen  | Durch Gehölzreihen gegliedertes, mesophiles, teils intensiv genutztes Grünland / Feuchtgrünland / Graben / Teich  |             | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum für Amphibienarten                 | 2    | LRP 94                  |
| <a href="#">912</a> | Östlich Vierhöfen   | Teilweise stillgelegte Sandabgrabung / Sandflächen / Sandtrockenrasen / Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte / Tümpel / Röhrichtvegetation / bodensaurer Eichenmischwald |             | Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet zahlreicher und gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten                      | 1    | LRP 94                  |
| <a href="#">913</a> | Südlich Vierhöfen   | Zahlreiche Abgrabungsgewässer / Schwimmblattvegetation / Gehölzbestände   |             | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Vogelarten   | 2    | LRP 94                  |

| ID                  | Lage                            | Kurzbeschreibung   | Arten                              | Bedeutung   | Wert | Quelle                |
|---------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---|------|-----------------------|
| <a href="#">914</a> | Nördlich Salzhausen             | Durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturierte, landwirtschaftliche Nutzfläche mit hohem Grünlandanteil / Erlenbruchwald und Erlen-Eschenwald-Fragmente                    |                                    | Gut strukturierte, z.T. naturnahe Lebensräume / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Brutbiotop gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Amphibienarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">915</a> | Nordöstlich Salzhausen          | Großes Grünlandgebiet / mesophiles Grünland Graben / kleiner Nadelforst  |                                    | Lebensraum gefährdeter Vogelarten / Nahrungsbiotop gefährdeter Wiesenvogelarten   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">916</a> | Luhe, nördlich Luhmühlen        | Tal der Luhe / teils naturnahes, teils begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Acker / Ufergehölze / Erlenbruch-Fragmente | Fischotter, Kranich                | Mäßig belastetes, teils naturnahes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum und Wandergebiet gefährdeter Fischarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten / Nahrungsbiotop für Fledermäuse / potentieller Fischotter-Lebensraum / Nahrungshabitat Kranich | 2    | LRP 94, FFH           |
| <a href="#">917</a> | Südlich Salzhausen (Gallerberg) | Trockene Grünlandbrache / Ruderalvegetation / Gebüsch / umgeben von Ackerflächen   |                                    | Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten  | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">918</a> | Südlich Luhmühlen               | Tal des Nordbaches / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Hybridpappelforst / Feuchtgrünland / brach gefallenes Feuchtgrünland                | Fischotter                         | Mäßig belastetes, naturnahes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94, FFH           |
| <a href="#">919</a> | Östlich Salzhausen              | Tal des Nordbaches / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Teich  | Fischotter                         | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum   | 2    | LRP 94                |
| <a href="#">920</a> | Östlich Luhmühlen               | Sumpf- und Röhrichvegetation / Teiche / Birken-Kiefern-Bruchwald   |                                    | Potentielle Lebensräume für gefährdete Amphibienarten   | 2    | Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">921</a> | Nordwestlich Heimbuch           | Flechten-Kiefernwald   |                                    | NSG: Gut ausgebildete Pflanzengesellschaft  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">922</a> | Südwestlich Undeloh             | Gehölzbestände / Grünland  | Schwarzstorch                      | Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel       |
| <a href="#">923</a> | Bei Heimbuch                    | Alter Laubmischwaldbestand (Eichen und Buchen), aus Hofgehölz hervorgegangen   | Hirschkäfer (Lucanus cervus), 1991 | NSG: Naturnaher Baumbestand / Vorkommen gefährdeter Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Käferarten / Standort gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Flora   |
| <a href="#">924</a> | Südwestlich Undeloh             | Vermutlich Toteisloch / degeneriertes Hochmoor / Pfeifengras-Degenerationsstadium / kleine offene Wasserstellen  |                                    | NSG: Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">925</a> | Hembucher Holz                  | Laubwald   | Neckera pumila                     | Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | NLWKN Flora           |
| <a href="#">926</a> | Südwestlich Undeloh             | Sandheide  |                                    | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten  | 1    | LRP 94                |
| <a href="#">927</a> | Südwestlich Undeloh             | Bodensaurer Eichen-Buchenwald / randlich Bodensaurer Nadel-Laubmischwald   |                                    | NSG: Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldbestände   | 1    | LRP 94                |

| ID                  | Lage                    | Kurzbeschreibung   | Arten  | Bedeutung  | Wert | Quelle                        |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|------|-------------------------------|
| <a href="#">928</a> | Südlich<br>Undeloh      | Seitenbachtal des Radenbaches / kleines naturnahes Fließgewässer / brach gefallenes Feuchtgrünland / nährstoffarmer Sumpf / Moorheide / randlich Nadelwald   |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Libellenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">929</a> | Südlich<br>Buchholz     | EU-Vogelschutzgebiet "Lüneburger Heide"  |  | EU-Vogelschutzgebiet : Lebensraum zahlreicher Tierarten  | 2    | EU-Vogelschutzgebiet          |
| <a href="#">930</a> | Südöstlich<br>Undeloh   | Sandheide / Wacholder-Gebüsch / Versuchsfeldfläche für Heidereregulation   | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen                     | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Schmetterlingsarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">931</a> | Östlich von<br>Undeloh  | Gehölzbestände / Grün- und Ackerland   | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Wendehals, Kranich | Brut- und Nahrungshabitat gefährdeter Vogelarten   | 2    | NLWKN Brutvogel               |
| <a href="#">932</a> | Südöstlich<br>Undeloh   | Radenbachtal / überwiegend begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / nährstoffarmer Sumpf / Seggenried / Moorheide / Erlenbruchwald-Fragmente |  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Vegetationsbestände / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogel- und Fischarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Libellen- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">933</a> | Südlich<br>Undeloh      | Sandheide / Wacholder-Gebüsch  | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen                     | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Vogelarten   | 1    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">934</a> | Südöstlich<br>Undeloh   | Seitenbachtal des Radenbaches / begradigtes Fließgewässer / Grünland / z.T. Feuchtgrünland / oligotrophes Stillgewässer / Schwimmblattvegetation / Hochmoorvegetation                              |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Libellenarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">935</a> | Südöstlich<br>Undeloh   | Sandheide / kleinflächig Feuchtheide / Wacholder-Gebüsch   | Heidelerche, Raubwürger, Schwarzkehlchen, Wendehals          | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien- und Heuschreckenarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Lebensraum gefährdeter Brutvogelarten  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">936</a> | Westlich<br>Sudermühlen | Sandheide / Wacholder-Gebüsch  |  | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilienarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">937</a> | Nördlich<br>Undeloh     | NSG: Lüneburger Heide / Grünland / Forst / Heideflächen  |  | NSG: Lebensraum gefährdeter Vogel- und Reptilienarten  | 1    | EU-Vogelschutzgebiet          |



| ID                  | Lage                   | Kurzbeschreibung   | Arten   | Bedeutung   | Wert | Quelle                        |
|---------------------|------------------------|--|---|---|------|-------------------------------|
| <a href="#">938</a> | Südlich Sudermühlen    | Tal der Schmalen Aue / überwiegend naturnahes Fließgewässer / Güteklasse II / Erlenbruchwald / Erlen-Eschenwald / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Ufergehölze | Fischotter  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Fisch- und Vogelarten / Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten / Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellen- und Schmetterlingsarten / potentieller Fischotter-Lebensraum | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">939</a> | Südöstlich Lübberstedt | Bodensaures Nadel-Laubmischwaldgebiet, z.T. mit reinen bodensauren Eichen-Buchenwäldern  |   | Möglichkeit zur Entwicklung naturnaher Waldgesellschaften   | 2    | LRP 94, Biotopkartierung 2009 |
| <a href="#">940</a> | Südwestlich Döhle      | Gehölzbestände / Grünland  | Braunkehlchen, Grünspecht, Rotrückenvürger, Wachtel, Ziegenmelker, Schwarzstorch  | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel               |
| <a href="#">941</a> | Südwestlich Döhle      | Kehmoor / Quellmoor / oligotrophes Stillgewässer / Moorheide / Feuchtgebüsch / nährstoffarmer Sumpf  | Großer Schillerfalter ( <i>Apatura iris</i> ) (1980), Hochmoor-Perlmutterfalter ( <i>Boloria aquilonaris</i> ), Großes Wiesenvögelchen ( <i>Coenonympha tullia</i> ) (1993) | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Reptilien-, Libellen- und Schmetterlingsarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">942</a> | Nördlich Döhle         | Bachtal / Grünland / Feuchtgrünlandbrache / Teich  | <i>Carex pseudobrizoides</i>  | Naturnahe Lebensräume / Lebensraum für Amphibienarten / Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten   | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">943</a> | Nördlich Döhle         | Ehemalige Sandabgrabung / Waldrand / Magerrasen  | <i>Carex pseudobrizoides</i>  | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum zahlreicher und gefährdeter Heuschreckenarten   | 1    | LRP 94, NLWKN Flora           |
| <a href="#">944</a> | Westlich Döhle         | Tal der Schmalen Aue / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Ufergehölze  | Fischotter  | NSG: Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum gefährdeter Fischarten / potentieller Fischotter-Lebensraum  | 1    | LRP 94                        |
| <a href="#">945</a> | Südwestlich Döhle      | Sandheide / Feuchtheide / nährstoffarmer Sumpf / nährstoffarmes Stillgewässer  | Hochmoor-Perlmutterfalter ( <i>Boloria aquilonaris</i> ) (1993), Schwarzstorch  | NSG: Vorkommen gefährdeter Ökosystemtypen / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum gefährdeter Amphibien- und Reptilienarten / Lebensraum gefährdeter Schmetterlingsarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch  | 1    | LRP 94                        |
| 945b                | Südwestlich Döhle      | Gewässer am Waldrand   |   | NSG: Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | NLWKN Fauna                   |
| <a href="#">946</a> | Südwestlich Döhle      | Gehölzbestände / Grünland / Heideflächen   | Schwarzstorch, Kranich  | Brutgebiet gefährdeter Vogelarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch   | 1    | NLWKN Brutvögel               |
| <a href="#">947</a> | Südlich Evendorf       | Tümpel im Grünland / Schwimmblattvegetation / Feuchtgebüsch  |   | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten / Lebensraum für Libellenarten   | 1    | LRP 94                        |

| ID                  | Lage                 | Kurzbeschreibung  | Arten         | Bedeutung  | Wert | Quelle                               |
|---------------------|----------------------|---|---------------|--|------|--------------------------------------|
| <a href="#">948</a> | Südöstlich Evendorf  | Tümpel im Grünland / Gehölzbestände   |               | Vermehrungsgebiet gefährdeter Amphibienarten   | 1    | LRP 94                               |
| <a href="#">949</a> | Südöstlich Evendorf  | Schwindebachtal / begradigtes Fließgewässer, z.T. aufgeweitet / Güteklasse II / Teich / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Nadelholzbestände  |               | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten   | 2    | LRP 94, NLWKN Fauna                  |
| 949b                | Südöstlich Evendorf  | Schwindebachtal / Grünland / Feuchtgrünland / Feuchtgrünlandbrache / Feuchtgebüsch / Nadelholzbestände  | Schwarzstorch | Mäßig belastetes Fließgewässer / Lebensraum für Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten / Nahrungshabitat Schwarzstorch                       | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna, NLWKN Brutvögel |
| <a href="#">950</a> | Östlich Eyendorf     | Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschenwald / Tümpel  |               | Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum gefährdeter Amphibienarten    | 1    | LRP 94                               |
| <a href="#">951</a> | Westlich Putensen    | Durch zahlreiche Waldstücke gegliederte landwirtschaftliche Nutzfläche mit hohem Grünlandanteil / mesophiler Buchenwald im Übergang zum bodensauren Eichen-Buchenwald / Erlen-Eschen-Quellwald / Nadel-Laubmischwald / kleiner Bach / Abgrabung |               | Quellgebiet / gut gegliederte, z.T. naturnahe Lebensräume / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten      | 2    | LRP 94                               |
| <a href="#">952</a> | Nordöstlich Putensen | Zu zahlreichen extensiven Fischteichen aufgestauter Nebenbach der Luhe / Röhrichtvegetation / Gehölzbestände  |               | Standort gefährdeter Pflanzenarten / Vermehrungsgebiet und Lebensraum für Amphibienarten / Lebensraum zahlreicher Libellenarten                | 2    | LRP 94                               |
| <a href="#">953</a> | Östlich Putensen     | Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruchwald-Reste / Ufergehölze / Acker   | Fischotter    | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum / Wandergebiet gefährdeter Fischarten | 1    | LRP 94, NLWKN Fauna                  |
| <a href="#">954</a> | Östlich Putensen     | Tal der Luhe / begradigtes Fließgewässer / Güteklasse II / Grünland / Feuchtgrünland / Erlenbruchwald-Reste / Ufergehölze / Sümpfe  | Fischotter    | Mäßig belastetes Fließgewässer / Standort gefährdeter Pflanzenarten / potentieller Fischotter-Lebensraum                                       | 2    | LRP 94                               |
| <a href="#">955</a> | Südlich Putensen     | Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald / Mesophiler Buchenwald / Erlen-Eschenwald / Quellgebiet / kleines Fließgewässer   |               | Quellgebiet / Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften / Standort gefährdeter Pflanzenarten / Lebensraum für Amphibienarten                    | 1    | LRP 94                               |

